

**Relatório da Excursão de Associados do**  
**Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre**  
**ao**  
**Parque Estadual do Tainhas**  
**18 a 20 de janeiro de 2019**



Foto: Antônio Brum

### **INTRODUÇÃO e RELATO**

Entre os dias 18 e 20 de janeiro de 2019, um grupo de associados do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre (COA/POA), estiveram visitando o Parque Estadual do Tainhas (PET), tendo como guia Eduardo Chiarani, que está estudando algumas espécies de aves no local. Foi a primeira saída de campo do ano de 2019 organizada por sócios do COA/POA.

Toda a organização da saída e jantas foram organizadas pela associada Vanessa Canabarro e seu esposo, Dieter Potter.

O PET está localizado na região dos Campos de Cima da Serra, no nordeste do Rio Grande do Sul. É uma unidade de conservação (UC) de proteção integral, criada em 1975, que possui uma área de 6.654 ha, abrangendo porções dos municípios de Jaquirana, São Francisco de Paula e Cambará do Sul. O parque é reconhecido como Área Importante para a Conservação das

Aves (IBA), dada sua importância para a conservação de aves ameaçadas de extinção.

O PET conta com uma riqueza de 208 espécies de aves registradas até o momento, das quais cerca de 150 podem ser regularmente encontradas no parque durante os meses da primavera e verão, de acordo com Eduardo Chiarani.

As observações foram realizadas principalmente no interior da UC, na área já adquirida pelo governo Estadual. O tempo se manteve instável durante os dois primeiros dias, com temperatura média de 18°C e em alguns momentos com ventos fortes. O último dia fez sol e a temperatura se elevou um pouco mais.

Registramos ao todo 97 espécies de aves, conforme lista a seguir, um número menor do que das saídas anteriores do COA/POA, provavelmente devido à chuva e ventos fortes e constantes. Os nomes científicos e populares seguem a literatura especializada citada abaixo<sup>1, 2</sup>.

Por fim, se faz um agradecimento especial ao Dieter Potter pelo preparo das jantas, com destaque ao saboroso churrasco que preparou.

Também agradecemos, especialmente, ao Eduardo Chiarani pela sua disposição para acompanhar o grupo e pelo compartilhamento de seu conhecimento sobre as aves do PET.

Cabe, ainda, agradecer à gestora do PET, Ketulyn Fuster Marques, e aos guardas que nos acolheram com muita hospitalidade.

Estiveram presentes na saída de campo: Vanessa Canabarro; Dieter Potter; Augusto Potter; Armando Divan; Lourenço Divan; Rosane Vera Marques; Fernando de Miranda Ramos; Jorge Wolf; Marta Mircato; Antônio Coimbra de Brum; Kleber Pinto Oliveira; Ines Vasconcelos; Felipe Matsusaki; Osmar Sehn e Eduardo Chiarani.

---

<sup>1</sup> Piacentini et al. (2015). Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Revista Brasileira de Ornitologia, 23(2):91-298.

<sup>2</sup> Bencke et al. (2010). Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, 100(4):519-556.

## ITINERÁRIO e CONSIDERAÇÕES

### Sexta-feira, 18 de janeiro

Alguns integrantes do grupo, que chegaram mais cedo, fizeram uma pequena volta pelas imediações da sede da UC, mas foram surpreendidos com uma forte chuva e tiveram que retornar. Uma variedade de aves foram registradas na própria sede, entre elas, o cuíu-cuíu, sanhaço-para-laranja, beija-flor-de-papo-branco, taperuçu-velho e andorinhão-de-coleira-branca.

### Sábado, 19 de janeiro

Pela parte da manhã, os observadores fizeram a trilha nas áreas de campos e banhados, onde estão as áreas de reprodução do Caboclinho-de-barriga-preta. Além desta ave, cabe destacar o registro do caminheiro-grande, caminheiro-de-barriga-canelada, canário-do-brejo, sanã-vermelha e um bando de 5 casais de papagaio-charão, que passaram sobrevoando.

### Domingo, 20 de janeiro

No último dia da saída o grupo percorreu o lado da cachoeira do Passo do S e mata ciliar, seguindo por um afluente do rio Tainhas, onde cabe destacar que foi ouvido o tapaculo-ferreirinho, no entanto a ave não se aproximou do grupo. No retorno à unidade o grupo registrou um casal de falcão-de-coleira.

## ESPÉCIES REGISTRADAS

Família	Nome Científico	Nome Popular
Tinamidae	<i>Rhynchotus rufescens</i>	perdiz / perdigão
	<i>Nothura maculosa</i>	codorna-amarela / perdiz
Anatidae	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	anani / pé-vermelho
Ciconidae	<i>Ciconia maguari</i>	maguari / joão-grande
phalacrocoracidae	<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá
	<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande
Ardeidae	<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira
	<i>Butorides striata</i>	socozinho
	<i>Theristicus caudatus</i>	curicaca
Threskiornithidae	<i>Mesembrinibis cayennensis</i>	coró-coró
	<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta
Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
	<i>Accipiter striatus</i>	gavião-miúdo
Accipitridae	<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó
	<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo
	<i>Milvago chimango</i>	chimango
Falconidae	<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro
	<i>Caracara plancus</i>	carcará
	<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri
	<i>Falco femoralis</i>	falcão-de-coleira
Rallidae	<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	saracura-do-banhado
	<i>Aramides saracura</i>	saracura-do-mato
	<i>Laterallus leucopyrrhus</i>	sanã-vermelha

Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
Scolopaciidae	<i>Gallinago paraguaiiae</i>	narceja
Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i>	avoante
	<i>Patagioenas cayennensis</i>	pomba-galega
	<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu
	<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão /asa-branca
Psittacidae	<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha
	<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiú-cuiú
	<i>Pionus maximiliani</i>	maitaca-verde
	<i>Amazona pretrei</i>	papagaio-charão
Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i>	taperuçu-de-coleira-branca
	<i>Cypseloides senex</i>	taperuçu-velho
Trochilidae	<i>Leucochloris albicollis</i>	beija-flor-de-papo-branco
Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande
Picidae	<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo
	<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó
Cariamidae	<i>Cariama cristata</i>	seriema
Thamnophilidae	<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata
Rhinocryptidae	<i>Scytalopus pachecoii</i>	tapaculo-ferreirinho
Dendrocolaptidae	<i>Lepidocolaptes falcinellus</i>	arapaçu-escamado-do-sul
Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro
	<i>Phacellodomus striaticollis</i>	tio-tio
	<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho
	<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném
	<i>Leptasthenura setaria</i>	grimpeiro
	<i>Leptasthenura striolata</i>	grimpeirinho
	<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo
Rhyocyclidae	<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato
Tyrannidae	<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha
	<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho
	<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre
	<i>Elaenia parvirostris</i>	guaracava-de-bico-curto
	<i>Elaenia mesoleuca</i>	tuque
	<i>Elaenia obscura</i>	tucão
	<i>Phyllomyias virescens</i>	piolhinho-verdoso
	<i>Myiodynastes maculatus</i>	bem-te-vi-rajado
	<i>Myiophobus fasciatus</i>	filipe
	<i>Lathrotriccus euleri</i>	enferrujado
	<i>Empidonomus varius</i>	peitica
	<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri
	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	maria-preta-bico-azulado
	<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno
	<i>Xolmis cinereus</i>	primavera
	<i>Tyrannus savana</i>	tesourinha
	<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré
	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari ou gente-de-fora-vem
	<i>Vireo chivi</i>	juruvira
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul
Hirundinidae	<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo
	<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco
	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa
Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra
Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira
	<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca
Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo
Motacillidae	<i>Anthus nattereri</i>	caminheiro-grande
	<i>Anthus hellmayri</i>	caminheiro-de-barriga-acanelada
Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico
Thraupidae	<i>Tangara sayaca</i>	sanhaço-cinzentos
	<i>Stephanophorus diadematus</i>	sanhaço-frade
	<i>Pipraeidea bonariensis</i>	sanhaço-papa-laranja
	<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro
	<i>Emberizoides ypiranganus</i>	canário-do-brejo

	<i>Poospiza nigrorufa</i>	quem-te-vestiu
	<i>Microspingus cabanisi</i>	quete-do-sul
	<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado
	<i>Sporophila caerulescens</i>	coleirinho
	<i>Sporophila melanogaster</i>	caboclinho-de-barriga-preta
Parulidae	<i>Setophaga pitayumi</i>	mariquita
	<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra
Icteridae	<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha
	<i>Molothrus bonariensis</i>	vira-bosta
	<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo
Fringillidae	<i>Spinus magellanicus</i>	pintassilgo

## **ANEXO FOTOGRÁFICO**