

RELATO SOBRE A VISITA AO REFUGIO DE VIDA SILVESTRE BANHADO DOS PACHECOS

No dia 08 de junho de 2013 integrantes do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre (COA-POA) participaram da observação de aves no Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos (RVSBP), em Viamão. A direção da Unidade de Conservação organizou a atividade como parte do programa de comemoração da Semana do Meio Ambiente.

A atividade contou com a participação de 14 pessoas, entre elas membros do COA-POA, técnicos da SEMA e populares interessados na observação de aves. No total foram registradas 75 espécies de aves durante a saída (lista abaixo).

Às 08:30h o gestor da unidade, biólogo André Osório, iniciou uma pequena palestra sobre o RVSBP, falando sobre a fauna local, número de espécies de aves e a importância do Refúgio para a conservação da fauna silvestre ameaçada de extinção, entre elas o cervo-do-pantanal (*Blastocerus dichotomus*).

Em seguida, o biólogo Eduardo Chiarani fez um breve relato sobre o COA-POA, falando das atividades do grupo. Também foi feita uma rápida explanação sobre guias de campo, mostrando exemplos de alguns guias disponíveis, suas diferenças e formas de utilização. Por fim, foram dadas algumas dicas sobre o uso e regulação de binóculo.

Ainda com forte neblina, o que dificulta a visualização das aves, às 09:30h o grupo se deslocou até a Trilha da Barragem e iniciou o percurso. Por volta das 10:30h a neblina se dissipou e um belo sol começou a mostrar as aves que antes só era possível ouvir. Além de aves aquáticas comuns no local, como marrecas, tachãs, garças, maçaricos e colhereiros, foi possível observar um grande bando de gaivota-maria-velha (*Chroicocephalus maculipennis*), com aproximadamente 200 indivíduos, e dois exemplares de trinta-réis-anão (*Sternula superciliaris*), sendo esta última registrada pela primeira vez no RVSBP e elevando para 223 o número total de espécies de aves do Refúgio. Aproximadamente às 13:00h o grupo retornou à sede da unidade para almoçar.

Às 15:00h iniciou a Trilha do Cervo, onde foi possível observar aves de ambientes mais secos, como matas de restinga e campos. No final do percurso foi possível ouvir alguns indivíduos de saci (*Tapera naevia*) vocalizando de forma bastante diferente daquele canto onomatopéico comumente ouvido, “sa-ci”.

Lista das aves observadas no Refúgio de Vida Silvestre banhado dos Pachecos no dia 08 de junho de 2013. Registro: V = visual; A = auditivo

| Família/Espécie | Nome em português | Registro |
|---|---------------------------|----------|
| Anhimidae | | |
| <i>Chauna torquata</i> (Oken, 1816) | tachã | V/A |
| Anatidae | | |
| <i>Dendrocygna bicolor</i> (Vieillot, 1816) | marreca-caneleira | V |
| <i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766) | marreca-piadeira ou irerê | V/A |

| | | |
|--|---|-----|
| <i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789) | marreca-pé-vermelho | V/A |
| Ciconiidae | | |
| <i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789) | joão-grande | V |
| Ardeidae | | |
| <i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783) | socó-boi-verdadeiro | V |
| <i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758 | garça-branca-grande | V |
| <i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824) | maria-faceira | V/A |
| Threskiornithidae | | |
| <i>Plegadis chihi</i> (Vieillot, 1817) | maçarico-preto | V |
| <i>Phimosus infuscatus</i> (Lichtenstein, 1823) | maçarico-de-cara-pelada ou chapéu-velho | V |
| <i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758 | colhereiro | V |
| Cathartidae | | |
| <i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758) | urubu-de-cabeça-vermelha | V |
| <i>Cathartes burrovianus</i> Cassin, 1845 | urubu-de-cabeça-amarela | V |
| <i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793) | urubu-de-cabeça-preta | V |
| Accipitridae | | |
| <i>Circus buffoni</i> (Gmelin, 1788) | gavião-do-banhado | V |
| <i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788) | gavião-carijó | V/A |
| <i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816) | gavião-de-rabo-branco | V |
| Falconidae | | |
| <i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777) | caracará | V/A |
| <i>Milvago chimango</i> (Vieillot, 1816) | chimango | V |
| <i>Falco sparverius</i> Linnaeus, 1758 | quiriquiri | V |
| Rallidae | | |
| <i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819) | sanã-carijó | A |
| <i>Pardirallus sanguinolentus</i> (Swainson, 1837) | saracura-do-banhado | A |
| Charadriidae | | |
| <i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782) | quero-quero | V/A |
| Recurvirostridae | | |
| <i>Himantopus melanurus</i> Vieillot, 1817 | pernilongo | V/A |
| Scolopacidae | | |
| <i>Gallinago paraguaiiae</i> (Vieillot, 1816) | narceja | V/A |
| Jacanidae | | |
| <i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766) | jaçanã | V |
| Laridae | | |
| <i>Chroicocephalus maculipennis</i> (Lichtenstein, 1823) | gaivota-maria-velha | V |
| Sternidae | | |
| <i>Sternula supercilialis</i> (Vieillot, 1819) | trinta-réis-anão | V |
| Columbidae | | |
| <i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813) | asa-branca ou pombão | V |

| | | |
|---|--------------------------------|-----|
| <i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847) | pomba-de-bando | V/A |
| <i>Leptotila verreauxi</i> Bonaparte, 1855 | juriti-pupu | A |
| Psittacidae | | |
| <i>Myiopsitta monachus</i> (Boddaert, 1783) | caturrita | V/A |
| Cuculidae | | |
| <i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788) | anu-branco | V/A |
| <i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766) | saci | A |
| Strigidae | | |
| <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763) | mocho-dos-banhados | V |
| Apodidae | | |
| <i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796) | andorinhão-de-coleira | V |
| Picidae | | |
| <i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818) | pica-pau-do-campo | V/A |
| Furnariidae | | |
| <i>Furnarius rufus</i> (Gmelin, 1788) | joão-de-barro | V/A |
| <i>Limnornis curvirostris</i> Gould, 1839 | joão-da-palha | V/A |
| <i>Schoeniophylax phryganophilus</i> (Vieillot, 1817) | bichoita | V/A |
| <i>Certhiaxis cinnamomeus</i> (Gmelin, 1788) | curutié | V/A |
| <i>Synallaxis spixi</i> Sclater, 1856 | joão-teneném | V/A |
| <i>Cranioleuca obsoleta</i> (Reichenbach, 1853) | arredio-oliváceo | V/A |
| Pipridae | | |
| <i>Chiroxiphia caudata</i> (Shaw & Nodder, 1793) | dançador | A |
| Rhynchocyclidae | | |
| <i>Tolmomyias sulphurescens</i> (Spix, 1825) | bico-chato-de-orelha-preta | V/A |
| Tyrannidae | | |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824) | risadinha | V/A |
| <i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) | amarelinho-do-junco | V |
| <i>Serpophaga nigricans</i> (Vieillot, 1817) | joão-pobre | V/A |
| <i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817) | alegrinho | V/A |
| <i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766) | bem-te-vi | V/A |
| <i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819) | suiriri-cavaleiro | V/A |
| <i>Hymenops perspicillatus</i> (Gmelin, 1789) | viuvinha-de-óculos | V |
| <i>Xolmis irupero</i> (Vieillot, 1823) | noivinha | V |
| Vireonidae | | |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789) | gente-de-fora-vem ou pitiguari | A |
| Hirundinidae | | |
| <i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817) | andorinha-pequena-de-casa | V |
| <i>Tachycineta leucorroha</i> (Vieillot, 1817) | andorinha-de-testa-branca | V |
| Troglodytidae | | |
| <i>Troglodytes musculus</i> Naumann, 1823 | corruíra | V/A |

| | | |
|---|-----------------------------|-----|
| Turdidae | | |
| <i>Turdus rufiventris</i> Vieillot, 1818 | sabiá-laranjeira | V/A |
| <i>Turdus amaurochalinus</i> Cabanis, 1850 | sabiá-poca | V/A |
| Mimidae | | |
| <i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823) | sabiá-do-campo | V/A |
| Emberizidae | | |
| <i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776) | tico-tico | V/A |
| <i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792) | tico-tico-do-campo | V/A |
| <i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766) | canário-da-terra-verdadeiro | V/A |
| <i>Emberizoides ypiranganus</i> Ihering & Ihering, 1907 | canário-do-brejo | V/A |
| <i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789) | sabiá-do-banhado | V/A |
| <i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783) | coleiro-do-brejo | V |
| Parulidae | | |
| <i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789) | pia-cobra | V/A |
| <i>Basileuterus leucoblepharus</i> (Vieillot, 1817) | pula-pula-assobiador | A |
| Icteridae | | |
| <i>Icterus pyrrhopterus</i> (Vieillot, 1819) | encontro | V/A |
| <i>Amblyramphus holosericeus</i> (Scopoli, 1786) | cardeal-do-banhado | V/A |
| <i>Agelasticus thilius</i> (Molina, 1782) | sargento | V |
| <i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819) | garibaldi | V/A |
| <i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789) | vira-bosta | V/A |
| Fringillidae | | |
| <i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766) | fim-fim | A |
| Passeridae | | |
| <i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758) | pardal | V/A |

Compilado por Eduardo Chiarani