



Relatório de Excursão do
Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre
ao

Parque Nacional da Lagoa do Peixe

14 e 15 de Março de 2015

Total de espécies registradas: 74

INTRODUÇÃO

O Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre – COA-POA – realizou sua sétima visita ao Parque Nacional da Lagoa do Peixe desde a sua reativação, em maio de 2009. Com aproximadamente 32.000 ha, o parque é considerado um “santuário das aves migratórias”, compreendendo diversos ecossistemas importantes para espécies residentes e migratórias.

Participantes em ordem alfabética:

Andrew Whittaker
Fernanda Ribeiro da Silva
Fernando de Miranda Ramos
Helena Backes
Jaqueline R. Fortuna
Juliana Gerhardt
Marco Aurélio Torres Antunes
Marisa da Costa
Roberto Dall'Agnol
Rodrigo Feistauer
Rosane Vera Marques

A seguir são apresentados breves comentários sobre as espécies registradas durante a excursão, enfatizando as observações mais relevantes.

Na trilha da Figueira, havia um bando misto, com destaque para: gaivota-maria-velha, pernilongo-de-costas-brancas, maçarico-de-perna-amarela, alguns trinta-réis (anão e grande), vira-pedras, baituruçu, maçarico-de-sobre-branco e maçarico-de-bico-virado.

Os bandos mais numerosos eram o de pernilongo-de-costas-brancas e o de gaivota-maria-velha, mas não ultrapassavam 100 indivíduos. Foi visto um flamingo, para satisfação geral do grupo.

No Talha-mar, o grande destaque foi o bando de mergulhão-de-orelha-branca, estimado em 300 indivíduos. Havia também bandos de talha-mar, gaivota-maria-velha trinta-reis-anão, carqueja-de-bico-manchado e capororoca. No campo entre a estradinha e a lagoa havia inúmeros caminheiro-de-espora, que deixaram que o grupo se aproximasse para fotos. Havia também um bando pequeno de flamingos, menos de 10 indivíduos numa distância bem grande da estrada.

No retorno pela praia, muitos piru-piru, alguns bandos mistos de trinta-réis e um maçarico-preto, ou caraúna-de-cara-branca, pescando à beira-mar.

Na barra, o maior bando, uns 300 indivíduos, era de diferentes trinta-réis, sendo o mais numeroso o trinta-réis-boreal. Também havia em grande número gaivota-maria-velha e maçarico-de-sobre-branco. O destaque foi para um trinta-réis-miúdo, que foi identificado pelo Andrew de muito longe e que foi “perseguido” pelo grupo para permitir fotos que ajudassem na identificação, que só foi obtida após o retorno, com a checagem das fotos. Outra espécie cujo registro era inédito para a maioria dos participantes foi a batuíra-de-coleira-dupla, com dois indivíduos bastante tranquilos com a aproximação do grupo.


Na praia, tanto na ida como na volta da barra, pequenos grupos de batuíra-de-coleira e batuíra-de-bando, maçarico-branco, gaivotão e gaivota-maria-velha, diversos trinta-réis e, apenas no final, alguns curriqueiros.

O maçarico-acanelado foi visto diversas vezes: na Figueira, no Talha-mar, com um bando de mais de 10 indivíduos no campo oposto a lagoa, e na barra, com um indivíduo se alimentando pelos cômoros.

O fato de não termos conseguido fazer a trilha do banhado da estrada para o Balneário Mostardense, devido aos problemas com atolamento (vide abaixo), pode ter contribuído para que o número total de espécies observadas ter ficado abaixo das saídas anteriores com o mesmo número de dias.

Por último, é importante ressaltar que a participação do Andrew foi fundamental para o resultado geral da saída. Sem a sua colaboração não teríamos identificado algumas espécies e com certeza não teríamos localizado o trinta-réis-miúdo no meio do grande bando de trinta-réis na barra.

ITINERÁRIO



Sábado, 14 de março

Das 11:30h às 14:30h, percorremos a trilha da Figueira (1), que estava bastante seca, permitindo chegar com carros bem perto do local de observação. Tão seca que os carros que não eram 4x4 tiveram dificuldades para passar o trecho de terra na entrada da trilha. Na sequência fomos a trilha do Talha-mar (2), permanecendo lá até às 17:30h, quando retornamos pela praia (3), entrando pela “estrada” do balneário mostardense (4). A parte inicial da estrada, logo depois do balneário, estava em condições muito ruins, com vários carros atolando no local. Isso fez com que chegássemos muito tarde no banhado, sendo possível ver pouquíssimas espécies dado o avançado da hora. O tempo estava bom e quente.

Domingo, 15 de março

No caminho para a Barra da Lagoa (5), entramos pela trilha do Talha-mar (2), evitando passar na estrada do balneário. Chegamos em torno das 8:30h na barra, que estava aberta, e ficamos até em torno de 12:30h, retornando pela praia (6) e entrando novamente pelo Talha-mar. O tempo estava quente, nublado pela manhã, abrindo sol pouco antes do meio-dia.

ESPÉCIES REGISTRADAS

Segue a relação das 74 espécies registradas:

Ordem	Família	Espécie	Nome comum	Local de registro	Status migratório
RHEIFORMES	RHEIDAE	<i>Rhea americana</i>	ema	Talha-mar	R
ANSERIFORMES	ANHIMIDAE	<i>Chauna torquata</i>	tachã	Talha-mar	R
	ANATIDAE	<i>Coscoroba coscoroba</i>	capororoca	Talha-mar	R
PODICEDIFORMES	PODICIPEDIDAE	<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão-caçador	Barra da Lagoa	R
		<i>Rollandia rolland</i>	mergulhão-de-orelha-branca	Talha-mar	R
PHOENICOPTERIFORMES	PHOENICOPTERIDAE	<i>Phoenicopterus chilensis</i>	flamingo-chileno	Talha-mar / Figueira	S
CICONIIFORMES	CICONIIDAE	<i>Ciconia maguari</i>	maguari	Talha-mar	R
		<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca	Talha-mar	M
SULIFORMES	PHALACROCORACIDAE	<i>Phalacrocorax brasilianus</i>	biguá	Talha-mar / barra da Lagoa	R
PELECANIFORMES	ARDEIDAE	<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande		R
		<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura	Praia, até a barra	R
		<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena		R
		<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira	Talha-mar	R
	THRESKIORNITHIDAE	<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru-de-cara-pelada		R
		<i>Plegadis chihi</i>	caraúna-de-cara-branca	Praia	R
ACCIPITRIFORMES	ACCIPITRIDAE	<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado	Talha-mar / Estrada balneário	R
		<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo	Talha-mar	R
		<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó	BR 101	R
GRUIFORMES	ARAMIDAE	<i>Aramus guarauna</i>	carão	Talha-mar	R
	RALLIDAE	<i>Fulica armillata</i>	carqueja-de-bico-manchado	Talha-mar	R
CHARADRIIFORMES	CHARADRIIDAE	<i>Charadrius collaris</i>	batuira-de-coleira	Praia, até a barra	R
		<i>Charadrius falklandicus</i>	batuira-de-coleira-dupla	Barra da Lagoa	R

Ordem	Família	Espécie	Nome comum	Local de registro	Status migratório
		<i>Charadrius semipalmatus</i>	batuíra-de-bando	Praia, até a barra / barra da Lagoa	N
		<i>Pluvialis dominica</i>	batuiriçu	Figueira / Barra da Lagoa	N
		<i>Pluvialis squatarola</i>	batuiriçu-de-axila-preta		N
		<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero	Por tudo	R
	HAEMATOPODIDAE	<i>Haematopus palliatus</i>	piru-piru	Praia	R
	RECURVIORIDAE	<i>Himantopus melanurus</i>	pernilongo-de-costas-brancas	Figueira	R
	SCOLOPACIDAE	<i>Limosa haemastica</i>	maçarico-de-bico-virado	Figueira	N
		<i>Tringa flavipes</i>	maçarico-de-perna-amarela	Figueira	N
		<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela	Figueira	N
		<i>Arenaria interpres</i>	vira-pedras	Figueira / Barra da Lagoa	N
		<i>Calidris alba</i>	maçarico-branco	Praia, até a barra / barra da Lagoa	N
		<i>Calidris fuscicollis</i>	maçarico-de-sobre-branco	Praia, até a barra / Figueira / barra da Lagoa	N
		<i>Calidris pusilla</i>	maçarico-rasteirinho	Barra da Lagoa	
		<i>Calidris subruficollis</i>	maçarico-acanelado	Figueira / Talhamar / barra da Lagoa	N
	JACANIDAE	<i>Jacana jacana</i>	jaçanã		R
	LARIDAE	<i>Chroicocephalus maculipennis</i>	gaivota-maria-velha	Figueira / Talhamar / barra da Lagoa	R
		<i>Larus dominicanus</i>	gaivotão	Praia, até a barra / barra da Lagoa	R
	STERNIDAE	<i>Sterna hirundo</i>	trinta-réis-boreal	Praia, até a barra / barra da Lagoa	N
		<i>Sterna trudeaui</i>	trinta-réis-de-coroa-branca	Praia, até a barra / barra da Lagoa	R
		<i>Sternula superciliaris</i>	trinta-réis-anão	Barra da Lagoa / Figueira / Talhamar	R
		<i>Sternula antillarum</i>	trinta-réis-miúdo	barra da Lagoa	N

Ordem	Família	Espécie	Nome comum	Local de registro	Status migratório
		<i>Thalasseus maximus</i>	trinta-réis-real	Praia, até a barra / barra da Lagoa	N/S
		<i>Thalasseus acuflavidus</i>	trinta-réis-de-bando	Praia, até a barra / barra da Lagoa	N/S
		<i>Sterna hirundinacea</i>	trinta-réis-de-bico-vermelho	Praia, até a barra / barra da Lagoa	N/S
		<i>Phaetusa simplex</i>	trinta-réis-grande	Figueira	R
	RYNCHOPIDAE	<i>Rynchops niger</i>	talha-mar	Figueira / Talha-mar / barra da Lagoa	R
COLUMBIFORMES	COLUMBIDAE	<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí	BR 101	R
		<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando	BR 101	
		<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão	Estrada Talha-mar	R
CUCULIFORMES	CUCULIDAE	<i>Guira guira</i>	anu-branco	Estradinhas	R
STRIGIFORMES	STRIGIDAE	<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira	Estrada para o Balneário	R
CORACIIFORMES	ALCEDINIDAE	<i>Megaceryle torquata</i>	martim-pescador-grande		R
PICIFORMES	PICIDAE	<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo	Figueira / estrada para o Talha-mar	R
		<i>Colaptes melanochloros</i>	pica-pau-verde-barrado		R
FALCONIFORMES	FALCONIDAE	<i>Caracara plancus</i>	caracará	Talha-mar / Praia	R
		<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro	Estrada para o Balneário	R
		<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri	Estrada para a Figueira	R
		<i>Milvago chimango</i>	chimango	Talha-mar	R
PASSERIFORMES	SCLERURIDAE	<i>Geositta cunicularia</i>	curriqueiro	Praia	R
	FURNARIIDAE	<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho	Figueira	R
		<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro		R
	TYRANNIDAE	<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi		R
		<i>Tyrannus melancholicus</i>	suiriri	Cidade	M
		<i>Xolmis irupero</i>	noivinha	Estrada para Figueira e Talha-mar	R
		<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro	Praia	R

Ordem	Família	Espécie	Nome comum	Local de registro	Status migratório
	HIRUNDINIDAE	<i>Progne tapera</i>	andorinha-do-campo	Figueira	M
		<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco	Talha-mar	R
	MIMIDAE	<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo	Figueira	R
	MOTACILLIDAE	<i>Anthus correndera</i>	caminheiro-de-espora	Talha-mar / barra da Lagoa	R
	ICTERIDAE	<i>Sturnella superciliaris</i>	polícia-inglesa-do-sul	Figueira / Talha-mar	R
		<i>Amblyramphus holosericeus</i>	cardeal-do-banhado	Estrada para o Balneário	R
	PASSARIDAE	<i>Passer domesticus</i>	pardal		R

Legenda *status* migratório: R = residente anual; M = residente de primavera/verão migratório; S = visitante de Cone Sul; N = visitante do Hemisfério Norte

ANEXO FOTOGRÁFICO



Foto oficial do grupo na trilha do Talha-mar
Foto de Roberto Luiz Dall Agnol



Na trilha da Figueira
Foto de Marco Aurélio Antunes



Na Barra da Lagoa
Foto de Marco Aurélio Antunes



Maçarico-de-sobre-branco, *Calidris fuscicollis*, se alimentando
Foto de Marco Aurélio Antunes



Batuíra-de-coleira-dupla, *Charadrius falklandicus*
Foto de Helena Backes



Trinta-réis-miúdo, *Sternula antillarum*
Foto de Helena Backes



Caracar, *Caracara plancus*
Foto de Marco Aurlio Antunes



Bandinho misto na trilha da Figueira, com pernilongos, gaivotas, trinta-reis e talhamar
Foto de Helena Backes



Cetáceo não identificado
Foto de Roberto Luiz Dall Agnol



Mergulhão-caçador, *Podilymbus podiceps*
Foto de Roberto Luiz Dall Agnol



Na estrada do Talha-mar.
Foto de Roberto Luiz Dall Agnol



Na trilha do Talha-mar, apreciando um grupo de, é claro, talha-mar
Foto de Marisa da Costa