

Relatório da saída do  
**Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre**  
à  
**Floresta Nacional de São Francisco de Paula**  
06 a 09 de fevereiro de 2016



Tapaculo-preto (*Scytalopus speluncae*). Foto: Wilson Mallmann

## **INTRODUÇÃO**

De 06 a 09 de fevereiro de 2016, realizamos a sexta edição da já tradicional saída de carnaval do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre (COA-POA) à Floresta Nacional de São Francisco de Paula (FLONA). A FLONA é uma unidade de conservação (UC) de uso sustentável administrada pelo ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, localizada no município de mesmo nome, na região nordeste do Rio Grande do Sul.

A superfície da FLONA é de 1.606 ha e as altitudes giram em torno dos 900 metros. A área protege importantes remanescentes de floresta ombrófila mista (mata com araucária), entremeados com antigos plantios de araucária, pinheiros exóticos e eucalipto. Está situada na borda oriental do Planalto das Araucárias, no topo da chamada Serra Geral. Como resultado dessa situação topográfica, as

florestas são muito úmidas, por causa da frequente condensação da umidade trazida pelos ventos ascendentes vindos do litoral.

As observações foram realizadas principalmente no interior da unidade de conservação, mas também em breves paradas ao longo da estrada de acesso, entre a RS-020 e a entrada da FLONA. As condições do tempo foram bastante favoráveis para a observação de aves, tendo em vista o predomínio de sol e pouco vento durante a saída. Apenas no último dia (09/02) choveu moderadamente por volta das 11h da manhã, quase no final da trilha percorrida nesta manhã.

Registramos ao todo 132 espécies durante a presente excursão. Destas, 118 espécies foram observadas dentro dos limites da FLONA e 14 foram registradas apenas em áreas do entorno da UC. O número de espécies observadas no interior da FLONA (118) foi o segundo maior já registrado em saídas do COA-POA à unidade, ficando ligeiramente atrás da saída de 2013, quando 120 espécies foram computadas. O número total de espécies (132) também ficou abaixo apenas em relação a uma saída (de 2014), quando o grupo se deslocou até o Passo da Ilha, no Parque Estadual do Tainhas, e observou um total de 139 espécies durante toda a excursão (considerando registros dentro e fora da FLONA). Compilando-se os registros obtidos em cinco visitas do COA-POA à FLONA (2012-2016), considerando as espécies observadas dentro e no entorno da UC, chega-se a um total de 185 espécies registradas até o momento.

Em 2016, quatro espécies ainda não haviam sido registradas no interior da FLONA em saídas do COA-POA à área (beija-flor-de-fronte-violeta, joão-de-barro, quem-te-vestiu e bandeirinha), embora sua ocorrência na unidade de conservação já fosse conhecida. Além disso, uma quinta espécie (estrelinha) representou uma adição à lista das aves da FLONA (disponível em [www.florestanacional.com.br](http://www.florestanacional.com.br)). Nas áreas de entorno três espécies correspondem a aves que não haviam sido antes observadas em saídas do COA-POA à região: o arredio-do-gravatá, a andorinha-de-testa-branca e o canário-do-brejo.

A seguir são listadas as espécies registradas durante a excursão, e também breves comentários sobre as observações mais relevantes. As espécies ameaçadas de extinção no Rio Grande do Sul, segundo o Decreto Estadual 51.797, de 8 de setembro de 2014, são indicadas pela sigla "AM". Aquelas registradas somente nos arredores da FLONA estão assinaladas com a letra "A" sobrescrita após o nome científico. A sequência sistemática e os nomes científicos seguem a mais recente lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (Piacentini et al. 2015)<sup>1</sup>. Os nomes populares estão de acordo com Bencke et al. (2010)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Piacentini et al. (2015). Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. *Revista Brasileira de Ornitologia*, 23(2):91-298.

<sup>2</sup> Bencke et al. (2010). Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre*, 100(4):519-556.

Agradecemos novamente à administração e aos funcionários da Floresta Nacional de São Francisco de Paula, pela autorização para a visita à área e pela acolhida e suporte durante nossa estada. Também ao associado Andrew Whittaker, pelas importantes contribuições de seus registros durante a saída.

## **ITINERÁRIO**

### **Sábado, 06 de fevereiro**

Encontro dos participantes no Centro de Informações Turísticas de São Francisco de Paula, às 9h, e no trevo de acesso à RS-484, às 9:40h. A chegada à FLONA se deu pouco depois das 10h. No trajeto até lá, fizemos breves paradas para observações ao longo da estrada, no trecho entre a RS-020 e a entrada da FLONA. Após o almoço (por volta das 13h), percorremos a Trilha Araucárias Centenárias. A tarde foi quente e ensolarada, com breves períodos de céu encoberto por nuvens. À noite, um pequeno grupo percorreu a Estrada Geral, por aproximadamente 1 km (duas horas). O céu estava limpo e bastante estrelado, com pouco vento.

### **Domingo, 07 de fevereiro**

Trilha Mirante da Cascata da Usina durante toda a manhã, com retorno para o alojamento ao meio-dia. À tarde, caminhada até a Cascata Bolo de Noiva, a partir das 15:30h. O dia todo foi ensolarado. À noite, alguns integrantes percorreram a Estrada Geral de carro, por aproximadamente uma hora. No início da noite, o céu estava encoberto, mas no final o vento aumentou de intensidade, prejudicando a “corujada”.

### **Segunda-feira, 08 de fevereiro**

Pela manhã, percorremos a Estrada Tena Silva, retornando pelo mesmo percurso até o alojamento, por volta das 11h. No início da tarde, uma participante encerrou sua participação na saída e os remanescentes percorreram o caminho que leva ao Morro dos Cavalos, por volta das 15h. Certamente foi o dia mais quente da saída, com um forte sol na parte da tarde.

### **Terça-feira, 09 de fevereiro**

No início da manhã três integrantes do grupo encerraram sua participação na saída e os remanescentes percorreram toda a Estrada do Macaco Branco. Ao contrário dos dias anteriores, a primeira parte da manhã foi de céu nublado e, ao final da manhã (por volta das 11h), começou a chover, quando o grupo estava quase no final da trilha.

## **ESPÉCIES REGISTRADAS**

### **TINAMÍDEOS (macucos, inambus e perdizes)**

#### **INAMBUGUAÇU (*Crypturellus obsoletus*)**

Canto ouvido poucas vezes durante a saída. Um indivíduo pôde ser brevemente visualizado no último dia, na Estrada do Macaco Branco. A ave estava à beira da trilha e saiu correndo a cerca de 7 metros dos observadores.

#### **PERDIGÃO (*Rhynchotus rufescens*)<sup>A</sup>**

Dois indivíduos ouvidos no caminho para o Morro dos Cavalos, vocalizando longe em áreas de campo.

### **CRACÍDEOS (jacus e jacutingas)**

#### **JACUAÇU (*Penelope obscura*)**

Um pequeno bando foi observado por alguns integrantes da saída.

### **ODONTOFORÍDEOS (urus)**

#### **URU (*Odontophorus capueira*)**

Um bando foi ouvido no final da Estrada Tena Silva, no dia 08, mas estava longe.

### **TRESKIORNITÍDEOS (maçaricos e colhereiro)**

#### **CURICACA (*Theristicus caudatus*)**

Quatro exemplares vistos e ouvidos nas araucárias próximas ao alojamento.

### **CATARTÍDEOS (urubus)**

#### **URUBU-DE-CABEÇA-VERMELHA (*Cathartes aura*)**

Observado sobrevoando em baixa altura as araucárias ao redor do alojamento e também na cascata Bolo de Noiva.

#### **URUBU-DE-CABEÇA-PRETA (*Coragyps atratus*)**

Sobrevoando a cascata Bolo de Noiva.

### **ACIPITRÍDEOS (gaviões e águias)**

#### **GAVIÃOZINHO (*Accipiter striatus*)**

No dia 08 alguns integrantes da saída estavam na frente do alojamento principal observando um bando de tesourinhas-do-mato no alto de um eucalipto, quando repentinamente elas voaram. Nesse momento o ornitólogo Andrew Whittaker (associado do COA) percebeu que algumas andorinhas começaram a vocalizar mais forte (só ele percebeu) e disse: “deve ter um gavião!”. Todos olharam para o céu e só viram andorinhas. Passados uns 10 segundos, um gaviãozinho passou próximo aos observadores carregando uma presa nas garras (uma

pequena ave). A experiência do mestre deixou todos boquiabertos, pois ninguém tinha visto o gavião (nem mesmo ele), apenas os sinais comportamentais das outras espécies. Foi um banho de conhecimento!

#### **GAVIÃO-CABOCLO (*Heterospizias meridionalis*)<sup>A</sup>**

Observado na estrada entre a entrada da FLONA e a RS-020, no dia 06, e depois no caminho para o Morro dos Cavalos, no dia 08, sobrevoando áreas limítrofes da FLONA, entre um talhão de Pinus e campos.

#### **GAVIÃO-CARIJÓ (*Rupornis magnirostris*)**

#### **GAVIÃO-DE-CAUDA-CURTA (*Buteo brachyurus*)**

No dia 06, um exemplar do foi observado em uma clareira sobre a Trilha Araucárias Centenárias.

#### **RALÍDEOS (saracuras e franços-d'água)**

#### **SARACURA-DO-MATO (*Aramides saracura*)**

Uma família composta por um casal e três jovens podia ser observada com certa frequência nas proximidades do alojamento, especialmente na estrada principal.

#### **PINTO-D'ÁGUA-AVERMELHADO (*Laterallus leucopyrrhus*)<sup>A</sup>**

Canto reconhecido em uma banhado com gravatás (*Eryngium* sp.) às margens da estrada entre a entrada da FLONA e a RS-020, na manhã do dia 06.

#### **COLUMBÍDEOS (pombos)**

#### **POMPA-GALEGA (*Patagioensa cayennensis*)**

No dia 08 uma pomba de grande porte, com uma coloração roxa bem visível, foi vista por alguns participantes perto da bifurcação entre a Trilha Cascata Bolo de Noiva e a Trilha Mirante da Usina. A ave passou voando por entre árvores altas, abaixo da copa destas. Provavelmente se trata de uma pomba-galega, pois além do descrito acima, a ave não apresentava nenhuma coloração branca na asa.

#### **JURITI-PUPU (*Leptotila verreauxi*)**

O canto dessa espécie, tão comum de ser ouvido nas matas, não foi detectado na saída. O registro da espécie se deu por um exemplar caminhando no início da Trilha Mirante Cascata da Usina.

#### **JURITI-GEMEDEIRA (*Leptotila rufaxilla*)**

Após ter sido ouvida em duas ocasiões, na Estrada Tena Silva, uma foi vista pousada em um galho na Estrada do Macaco Branco, no dia 09.

#### **PARIRI (*Geotrygon montana*)**

Um exemplar foi visto por um integrante da saída.

#### **CUCULÍDEOS (alma-de-gato, anus, papa-lagartas)**

#### **ALMA-DE-GATO (*Piaya cayana*)**

## **ESTRIGÍDEOS (corujas)**

### **CORUJINHA-DO-SUL (*Megascops sanctaecatarinae*)**

Ouvida em várias ocasiões ao redor dos alojamentos e da sede, inclusive antes de anoitecer. Visualizada em, pelo menos, duas oportunidades à noite.

### **CORUJA-LISTRADA (*Strix hylophila*)**

Na noite do dia 06 um indivíduo respondeu rapidamente ao *playback*, na Estrada Geral, a cerca de 500 metros ao norte do alojamento. Se aproximou e permitiu uma boa visualização. Depois continuou vocalizando por algum tempo.

### **CABURÉ-ACANELADO (*Aegolius harrisii*) ?**

No dia 06 estávamos reproduzindo o *playback* dessa espécie, na Estrada Geral da FLONA, a cerca de 750 metros ao norte dos alojamentos (29° 25' 3.71" S; 50° 23' 4.15" O), quando um participante (o ornitólogo Andrew Whittaker) disse ter escutado seu canto, emitido em volume bem baixo. Continuamos tentando atrair a espécie por uns 20 minutos (sem sucesso) até que uma coruja-listrada começou a vocalizar bem próximo dali. Com a possibilidade de esta coruja maior ter “assustado” o caburé-acanelado, decidimos tentar outro dia. No dia 07 retornamos ao local e tentamos atrair a espécie por cerca de 30 minutos, novamente sem sucesso. Em 05/04/2014 o observador/fotógrafo Paulo Fenalti registrou o caburé-acanelado próximo a este local (Fenalti 2014)<sup>3</sup>. Embora a espécie não tenha sido computada no número total de registros obtidos em nossa saída, fica aqui a dica para futuras observações no local.

## **CAPRIMULGÍDEOS (bacuraus)**

### **TUJU (*Lurocalis semitorquatus*)**

Foi ouvido sobrevoando a área dos alojamentos.

## **APODÍDEOS (andorinhões)**

### **ANDORINHÃO (*Cypseloides sp.*)<sup>A</sup>**

Alguns indivíduos foram vistos sobrevoando áreas abertas no Morro dos Cavalos. Não foi possível uma identificação mais precisa ao nível de espécie.

### **ANDORINHÃO (*Streptoprocne sp.*)<sup>A</sup>**

Alguns indivíduos foram vistos sobrevoando áreas abertas no Morro dos Cavalos. No entanto, a distância em que as aves estavam não permitiu uma diferenciação entre o andorinhão-de-coleira e o andorinhão-de-coleira-falha.

### **ANDORINHÃO-DE-SOBRE-CINZENTO (*Chaetura cinereiventris*)**

Um bando com quatro indivíduos voava sobre o alojamento principal, no dia 08, juntamente com andorinhas-pequenas-de-casa e andorinhas-de-sobre-acanelado. Em algumas ocasiões foi possível ouvir a vocalização das aves.

<sup>3</sup> Fenalti, P. R. (2014). [WA1292082, *Aegolius harrisii* (Cassin, 1849)]. Wiki Aves - A Enciclopédia das Aves do Brasil. Disponível em: <http://www.wikiaves.com/1292082>

### **ANDORINHÃO-DO-TEMPORAL (*Chaetura meridionalis*)**

Um exemplar passou sobrevoando a área dos alojamentos no dia 07.

### **TROQUILÍDEOS (beija-flores)**

#### **BEIJA-FLOR-DE-TOPETE (*Stephanoxis lalandi*)**

Uma fêmea e um macho jovem foram observados.

#### **BESOURINHO-DE-BICO-VERMELHO (*Chlorostilbon lucidus*)**

#### **BEIJA-FLOR-DE-FRONTE-VIOLETA (*Thalurania glaucopis*)**

Um indivíduo foi observado no caminho para a Cascata Bolo de Noiva.

#### **ESTRELINHA (*Calliphlox amethystina*)**

Um macho foi avistado no último dia da saída, pelo ornitólogo Andrew Whittaker, no caminho para a Cascata Bolo de Noiva. A espécie representa um registro novo para a FLONA.

### **TROGONÍDEOS (surucuás)**

#### **SURUCUÁ-VARIADO (*Trogon surrucura*)**

A espécie foi detectada quatro vezes durante a saída, geralmente em casais. Alguns indivíduos apresentavam a cauda bem curta, o que pode ser resultado do desgaste ou quebra das penas pelo atrito ao entrar no ninho (geralmente em cavidades como ocos de árvores e cupinzeiros).

#### **SURUCUÁ-DE-BARRIGA-AMARELA (*Trogon rufus*)**

Ouvido duas vezes ao longo da saída, na volta da Trilha Mirante Cascata da Usina e no final da Estrada Tena Silva.

### **RAMFASTÍDEOS (tucanos e araçaris)**

#### **TUCANO-DE-BICO-VERDE (*Ramphastos dicolorus*)**

### **PICÍDEOS (pica-paus)**

#### **PICA-PAU-ANÃO-CARIJÓ (*Picumnus nebulosus*)**

Um macho foi bem observado na volta da Estrada Tena Silva, enquanto se alimentava. A ave fazia pequenos furos em um galho vertical fino, de onde tirava o alimento. No dia 09 um casal foi visto na Estrada do Macaco Branco.

#### **PICAPAUZINHO-VERDE-CARIJÓ (*Veniliornis spilogaster*)**

#### **PICA-PAU-DOURADO (*Piculus aurulentus*)**

Apenas ouvido durante a saída em, pelo menos, três ocasiões.

#### **PICA-PAU-VERDE-BARRADO (*Colaptes melanochloros*)**

Observado apenas na borda da mata no caminho para o Morro dos Cavalos.

### **CARIAMÍDEOS (seriema)**

#### **SERIEMA (*Cariama cristata*)<sup>A</sup>**

Ouvida a partir do alojamento, provavelmente nas áreas de campo no entorno imediato da FLONA.

### **FALCONÍDEOS (falcões e caracaras)**

#### **CARACARÁ (*Caracara plancus*)**

Observado na FLONA (um indivíduo sobrevoando a áreas dos alojamentos) e nas áreas abertas do entorno.

#### **CARRAPATEIRO (*Milvago chimachima*)**

Observado próximo aos alojamentos.

### **PSITACÍDEOS (araras, papagaios e periquitos)**

#### **TIRIBA-DE-TESTA-VERMELHA (*Pyrrhura frontalis*)**

Diversos bandos dessas aves foram vistos e ouvidos ao longo da saída, sempre bastante barulhentas em seus voos.

#### **CUIÚ-CUIÚ (*Pionositta pileata*)**

Geralmente ouvido enquanto voavam alto.

#### **MAITACA-BRONZEADA (*Pionus maximiliani*)**

Pequenos bandos (de três a cinco indivíduos) ou até mesmo exemplares solitários foram vistos sempre em voo.

#### **PAPAGAIO-DE-PEITO-ROXO (*Amazona vinacea*)- AM**

#### **SABIÁ-CICA (*Tricharia malachitacea*)**

Foram poucos os registros dessa espécie durante a saída (dois ou três pequenos bandos).

### **TAMNOFILÍDEOS (chocas)**

#### **CHOQUINHA-LISA (*Dysithamnus mentalis*)**

#### **CHOCA-DA-MATA (*Thamnophilus caerulescens*)**

#### **MATRACÃO (*Batara cinerea*)**

Registrado em três locais da FLONA. Um casal se aproximou e foi bem observado na Trilha Mirante Cascata da Usina.

#### **CHOQUINHA-CARIJÓ (*Drymophila malura*)**

A espécie foi relativamente incomum durante a saída, provavelmente por vocalizar pouco e, talvez, passar despercebida.

## **CONOPOFAGÍDEOS (chupa-dentes)**

### **CHUPA-DENTE (*Conopophaga lineata*)**

## **GRALARÍDEOS (tovacuços e pintos-do-mato)**

### **PINTO-DO-MATO (*Hylopezus nattereri*)**

Ouvido em pelo menos três locais diferentes durante a saída. Embora dois indivíduos estivessem próximos, a visualização deste habitante dos solos das florestas foi quase nula. Apenas na Trilha Mirante Cascata da Usina um exemplar foi brevemente avistado por um dos observadores.

## **RINOCRIPTÍDEOS (tapaculos e macuquinhos)**

### **TAPACULO-PRETO (*Scytalopus speluncae*)**

Registrado em quatro locais distintos da FLONA. Em duas oportunidades diferentes a espécie se aproximou bastante dos observadores (cerca de 3 metros), permitindo, inclusive, algumas boas fotos. Chamou a atenção pela dificuldade de ser visualizado em meio à mata, devido ao seu tamanho diminuto, coloração escura e deslocamento rápido no chão da floresta. Alguns participantes ficaram surpresos com o seu canto forte e de longa duração.

## **FORMICARÍDEOS (tovacas e galinhas-do-mato)**

### **TOVACA-CAMPAINHA (*Chamaeza campanisona*)**

Ouvida em diversos locais durante as trilhas percorridas, porém raramente visualizada.

## **ESCLERURÍDEOS (vira-folhas)**

### **VIRA-FOLHA (*Sclerurus scansor*)**

Relativamente comum na mata nativa, mas difícil de ser observado. No dia 07, voltando da Trilha Mirante Cascata da Usina, um indivíduo voou do chão e ficou pousado em um galho a cerca de 3 metros de altura, bem exposto. Isso permitiu uma boa observação e algumas boas fotografias.

## **DENDROCOLAPTÍDEOS (arapaços)**

### **ARAPAÇU-VERDE (*Sittasomus griseicapillus*)**

Bastante frequente durante a saída. Sua voz era facilmente ouvida nas trilhas.

### **ARAPAÇU-RAJADO (*Xiphorhynchus fuscus*)**

Relativamente comum, os registros da espécie ocorreram mais por sua vocalização ao longo das trilhas. Um indivíduo se aproximou do *playback*, tornando possível ver a garganta de cor “creme”, diferenciando-o do arapaçu-escamoso-do-sul, que possui garganta branca.

### **ARAPAÇU-DE-BICO-TORTO (*Campylorhamphus falcularius*)**

Um indivíduo foi ouvido no início da Estrada Tena Silva, no dia 08. Após o *playback* foi possível vê-lo cruzando rapidamente a estrada em vôo, porém não se aproximou muito e não foi mais visto.

**ARAPAÇU-ESCAMOSO-DO-SUL (*Lepidocolaptes falcinellus*)**

Um dos arapaçus mais frequentes durante a saída (juntamente com o arapaçu-verde), seu canto podia ser ouvido em diversos locais da FLONA.

**ARAPAÇU-GRANDE (*Dendrocolaptes platyrostris*)**

Registrado apenas pela sua vocalização.

**ARAPAÇU-DE-GARGANTA-BRANCA (*Xiphocolaptes albicollis*)**

Um indivíduo foi observado no início da Trilha Araucárias Centenárias, na tarde do dia 06. Depois, a espécie foi ouvida em, pelo menos, duas ocasiões.

**XENOPÍDEOS (bico-virado)**

**BICO-VIRADO-CARIJÓ (*Xenops rutilans*)**

**FURNARÍDEOS (joões-de-barro, limpa-folhas etc)**

**PEDREIRO (*Cinclodes pabsti*)<sup>A</sup> – AM**

Observado pousado em moirões de cerca à beira da estrada entre a entrada da FLONA e a RS-020.

**JOÃO-DE-BARRO (*Furnarius rufus*)**

Ouvido ao amanhecer do dia junto à sede da FLONA. A espécie ainda não havia sido registrada pelo COA na unidade.

**LIMPA-FOLHA-DE-TESTA-BAIA (*Philydor rufum*)**

Observado apenas uma vez durante a saída, no dia 09, na Estrada do Macaco Branco. Era um bando com quatro indivíduos.

**TREPADORZINHO (*Heliobletus contaminatus*)**

Espécie bastante comum durante a saída, geralmente visto em pares e em árvores altas.

**TREPADOR-QUIETE (*Syndactyla rufosuperciliata*)**

**GRIMPEIRINHO (*Leptasthenura striolata*)**

Mais comum na área dos alojamentos da FLONA do que nas trilhas. Um indivíduo foi visto (por mais de uma vez) entrando sob as telhas do forro do alojamento principal. Houve a suspeita de poder haver um ninho ali, uma vez que a espécie busca cavidades para nidificar.

**GRIMPEIRO (*Leptasthenura setaria*)**

**PICHORORÉ (*Synallaxis ruficapilla*)**

Registrado em três locais diferentes. Na Estrada do Macaco Branco um jovem acompanhava dois adultos.

**PI-PUÍ (*Synallaxis cinerascens*)**

**JOÃO-TENENÉM (*Synallaxis spixi*)**

**ARREDIO-DO-GRAVATÁ (*Limnocittes rectirostris*)<sup>A</sup>**

Canto reconhecido em uma banhado com gravatás (*Eryngium* sp.) às margens da estrada entre a entrada da FLONA e a RS-020, na manhã do dia 06.

**ARREDIO-OLIVÁCEO (*Cranioleuca obsoleta*)**

Apenas um indivíduo foi visto e ouvido próximo aos alojamentos.

**PIPRÍDEOS (dançadores ou tangarás)**

**DANÇADOR (*Chiroxiphia caudata*)**

Adultos e jovens foram registrado em vários locais durante a saída. No dia 06 um macho adulto se aproximou bem dos observadores e impressionou com as diversas vocalizações que fez.

**TITIRÍDEOS (anambés e caneleiros)**

**ANAMBÉ-BRANCO-DE-RABO-PRETO (*Tityra cayana*)**

**CANELEIRINHO-PRETO (*Pachyramphus polychopterus*)**

Certamente o titirídeo mais comum durante a saída. Machos e fêmeas puderam ser observados em diversos locais.

**CANELEIRO-DE-CHAPÉU-PRETO (*Pachyramphus validus*)**

Registrado apenas ao lado do alojamento principal.

**COTINGÍDEOS (pavó e araponga)**

**ARAPONGA OU FERREIRO (*Procnias nudicollis*) – AM**

Muitos indivíduos foram ouvidos durante a saída. No dia 06 um macho pôde ser bem observado enquanto vocalizava (por cerca de 15 minutos), no alto de uma árvore com galhos secos, na encosta da mata existente na Trilha Araucárias Centenárias. A ave pareceu não se importar com o barulho vindo da empolgação do grupo ao vê-la.

**TESOURINHA-DO-MATO (*Phibalura flavirostris*)**

Um grupo incluindo jovens e adultos foi visto nos eucaliptos altos que ficam atrás da sede da FLONA e também nas árvores na frente da sede. O grupo chegou a ter 11 indivíduos, constituindo, possivelmente, um dos maiores bandos já vistos no estado, e seguramente o maior já visto pelo COA na FLONA. Em 2015 um bando de nove indivíduos foi observado no mesmo local.

## **PIPRITÍDEOS**

### **CANELEIRINHO-DE-BONÉ-PRETO (*Piprites pileata*)**

No dia 06 dois indivíduos foram ouvidos no trecho inicial da Trilha Araucárias Centenárias. No dia 07, outras duas aves foram observadas no início da Trilha Cascata Bolo de Noiva, mesmo local em que foram registradas em anos anteriores. Após o *playback*, os indivíduos pousaram bem acima dos observadores, na copa de uma árvore com cerca de 8 metros, permitindo boas observações e fotos. Não foi possível ver muitos detalhes da parte superior das aves, o que não permitiu dizer se tratava de um casal (provavelmente sim).

## **PLATIRINQUÍDEOS (patinhos e afins)**

### **PATINHO (*Platyrinchus mystaceus*)**

Comum e facilmente ouvido na mata.

## **RINCOCICLÍDEOS (papa-moscas, borboletinhas, tororós etc)**

### **BORBOLETINHA-DO-MATO (*Phylloscartes ventralis*)**

### **BICO-CHATO-DE-ORELHA-PRETA (*Tolmomyias sulphurescens*)**

Pelo menos três registros foram feitos, em diferentes locais da FLONA.

### **TORORÓ (*Poecilotriccus plumbeiceps*)**

A espécie estava silenciosa durante a saída, possibilitando apenas um registro.

### **CATRACA (*Hemitriccus obsoletus*)**

Espécie comum durante a saída. Facilmente ouvida na mata, porém difícil de ser atraída para perto e visualizada.

## **TIRANÍDEOS (guaracavas, piolhinhos, alegrinhos, suiriris, bem-te-vis etc)**

### **RISADINHA (*Camptostoma obsoletum*)**

### **GUARACAVA-DE-BICO-CURTO (*Elaenia parvirostris*)**

Poucos registros dessa espécie.

### **TUQUE (*Elaenia mesoleuca*)**

Certamente a espécie mais frequente e abundante durante a saída. Ouvida em praticamente todos os locais. No dia 07 foi observada a construção de um ninho em um galho sobre a Trilha Cascata da Usina, a cerca de 5 metros de altura. O ninho estava próximo à extremidade do galho. Um indivíduo trazia no bico o que parecia ser pedaços de líquens.

### **PIOLHINHO-VERDOSO (*Phyllomyias virescens*)**

### **PIOLHINHO (*Phyllomyias fasciatus*)**

Bastante ouvido durante a saída, mas pouco visto pelo grupo.

**CAPITÃO-CASTANHO (*Attila phoenicurus*)**

Foi mais facilmente ouvido nas trilhas, mas também pôde ser observado em algumas ocasiões. Na Estrada do Macaco Branco, dois indivíduos se aproximaram bem.

**IRRÉ (*Myiarchus swainsoni*)**

**BEM-TE-VI-RAJADO (*Myiodynastes maculatus*)**

**SUIRIRI (*Tyrannus melancholicus*)**

**PEITICA (*Empidonomus varius*)**

**FILIFE (*Myiophobus fasciatus*)**

Um indivíduo foi observado no início da Trilha Mirante da Cascata da Usina e também na Estrada Geral, no acesso ao Morro dos Cavalos.

**ENFERRUJADO (*Lathrotriccus euleri*)**

**MARIA-PRETA-DE-BICO-AZULADO (*Knipolegus cyanirostris*)**

Um macho foi visto pousado no alto de um galho de araucária, de onde vocalizava. A ave ficou, pelo menos, 5 minutos emitindo fracos assobios, o que não é muito comum de acontecer.

**VIREONÍDEOS (juruvieras e pitiguari)**

**GENTE-DE-FORA-VEM OU PITIGUARI (*Cyclarhis gujanensis*)**

**JURUVIARA (*Vireo chivi*)**

Bastante comum nas matas da FLONA.

**VERDINHO-COROADO (*Hylophilus poicilotis*)**

**CORVÍDEOS (gralhas)**

**GRALHA-AZUL (*Cyanocorax caeruleus*)**

Pequenos bandos avistados ao longo das trilhas. Mais facilmente ouvidas do que vistas.

**HIRUNDINÍDEOS (andorinhas)**

**ANDORINHA-PEQUENA-DE-CASA (*Pygochelidon cyanoleuca*)**

Vários adultos e jovens sobrevoando e depois pousando sobre fios elétricos na área dos alojamentos.

**ANDORINHA-SERRADORA (*Stelgidopteryx ruficollis*)**

Pelo menos dois exemplares pousados nos fios elétricos em frente ao alojamento principal, junto com diversas andorinhas-pequenas-de-casa.

**ANDORINHA-DO-CAMPO (*Progne tapera*)<sup>A</sup>**

Observada no dia 09, na estrada entre a FLONA e a RS-020.

**ANDORINHA-DE-TESTA-BRANCA (*Tachycineta leucorrhoa*)<sup>A</sup>**

Observada no dia 09, na estrada entre a FLONA e a RS-020.

**ANDORINHA-DE-SOBRE-ACANELADO (*Petrochelidon pyrrhonota*)**

Observada no dia 08 sobrevoando a área dos alojamentos, junto com andorinhas-pequenas-de-casa, porém voavam mais alto destas. Também foi observada no final do caminho para o Morro dos Cavalos.

**TROGLODITÍDEOS (corruíras)**

**CORRUÍRA (*Troglodytes musculus*)**

Um indivíduo estava na área da sede.

**TURDÍDEOS (sabiás)**

**SABIÁ-UNA (*Turdus flavipes*)**

Um indivíduo cantando no início da Trilha Araucárias Centenárias. Outro foi avistado no final da mesma trilha, no dia 06. Na Trilha Mirante da Cascata da Usina um terceiro indivíduo foi registrado.

**SABIÁ-LARANJEIRA (*Turdus rufiventris*)**

Apesar de ser um sabiá comum em muitos lugares, poucos registros foram feitos na saída.

**SABIÁ-POCA (*Turdus amaurochalinus*)**

Poucos registros dessa espécie durante a saída.

**SABIÁ-COLEIRA (*Turdus albicollis*)**

Registrado em apenas duas ocasiões durante as trilhas percorridas.

**MIMÍDEOS (sabiá-do-campo, sabiá-da-praia)**

**SABIÁ-DO-CAMPO (*Mimus saturninus*)<sup>A</sup>**

No trajeto entre a RS-020 e a entrada da FLONA.

**PASSERELÍDEOS (tico-ticos e afins)**

**TICO-TICO (*Zonotrichia capensis*)**

Adultos e jovens podiam ser facilmente observados no gramado em frente ao alojamento principal.

**PARULÍDEOS (pula-pulas e mariquitas)**

**MARIQUITA (*Setophaga pitiayumi*)**

Geralmente detectada por seu canto na copa das árvores.

### **PULA-PULA (*Basileuterus culicivorus*)**

### **PULA-PULA-ASSOBIADOR (*Myiothlypis leucoblephara*)**

Facilmente ouvido nas matas e algumas vezes se aproximou dos observadores.

### **ICTERÍDEOS (pássaros-pretos, soldados e quaxe)**

### **TECELÃO (*Cacicus chrysopterus*)**

Poucos registros. Em uma ocasião, um jovem foi observado sendo alimentado por um adulto.

### **TRAUPÍDEOS (trinca-ferros, sanhaços, saíras, tiês, cardeais, canários e papa-capins)**

### **SAÍRA-VIÚVA (*Pipraeidea melanonota*)**

Saíra bastante frequente nas trilhas e também na área da sede. Mais facilmente notada por seu canto.

### **SANHAÇU-FRADE (*Stephanophorus diadematus*)**

Bem comum a observação de adultos e jovens em diversos locais da FLONA.

### **SANHAÇU-CINZENTO (*Tangara sayaca*)**

Registrado apenas na área dos alojamentos.

### **SAÍRA-PRECIOSA (*Tangara preciosa*)**

A espécie foi relativamente comum durante a saída, mas houveram poucos avistamentos que permitissem boas fotos dessa bela espécie.

### **CANÁRIO-DA-TERRA-VERDADEIRO (*Sicalis flaveola*)**

Comum na área da sede.

### **SAÍ-DE-PERNAS-PRETAS (*Dacnis nigripes*) ??**

Embora a espécie não tenha sido confirmada e, tampouco, contabilizada no número total de registros obtidos em nossa saída, achamos importante deixar aqui este relato para que futuros observadores fiquem atentos à possibilidade de sua ocorrência no local. Na tarde do dia 08 estávamos em frente ao alojamento principal quando um bandinho de aves passou vocalizando em voo. Na hora, o ornitólogo Andrew pensou que pudesse se tratar do saí-de-pernas-pretas, principalmente pela sua vocalização. As aves pousaram bem no alto das árvores em frente à sede. Conseguimos ver apenas quando três indivíduos de porte pequeno e cauda curta se deslocaram de uma árvore à outra, emitindo chamados. Não foi possível ver nenhum detalhe da plumagem e a suspeita de ser a espécie se deu principalmente pela voz, porte e comportamento das aves. O saí-de-pernas-pretas não possui registros no Rio Grande do Sul (apenas o saí-azul). Ocorre na Mata Atlântica, principalmente no sudeste do Brasil, e sua distribuição mais austral conhecida é o nordeste de Santa Catarina. Assim como muitas espécies que vem se expandindo ao sul de sua distribuição, o mesmo pode estar ocorrendo com o saí-de-pernas-pretas. O macho desta espécie é

muito semelhante ao saí-azul (difere basicamente pela cor dos tarsos), enquanto as fêmeas são mais facilmente reconhecíveis.

**COLEIRINHO (*Sporophila caerulescens*)**

Um macho observado na área da sede.

**CABOCLINHO-DE-BARRIGA-PRETA (*Sporophila melanogaster*)<sup>A</sup> – AM**

Um casal foi visto no caminho entre a FLONA e a RS-020, à beira da estrada no dia 06.

**SABIÁ-DO-BANHADO (*Embernagra platensis*)<sup>A</sup>**

Dois indivíduos (provavelmente um casal) estavam em área de campo úmido junto ao limite da FLONA, no caminho para o Morro dos Cavalos. Também foi visualizado na estrada entre a FLONA e a RS-020.

**CANÁRIO-DO-BREJO (*Emberizoides ypiranganus*)<sup>A</sup>**

Um indivíduo ouvido na tarde do dia 08 estava em área de campo úmido junto ao limite da FLONA, no caminho para o Morro dos Cavalos. Também foi visualizado junto ao trevo da RS-020, na entrada da estrada que dá acesso à FLONA.

**TRINCA-FERRO-VERDADEIRO (*Saltator similis*)**

Alguns registros ao longo das trilhas. Um indivíduo estava se alimentando dos pseudofrutos do pinheiro-bravo (*Podocarpus lambertii*).

**QUEM-TE-VESTIU (*Poospiza nigrorufa*)**

Ouvido no final do caminho para o Morro dos Cavalos, estando em uma área de capoeira, dentro dos limites da FLONA. Anteriormente, a espécie só havia sido registrada pelo COA fora da unidade.

**QUETE (*Microspingus cabanis*)**

Geralmente em pequenos bandos, mas também indivíduos solitários foram vistos ao longo das trilhas.

**FRINGILÍDEOS (pintassilgos e gaturamos)**

**PINTASSILGO (*Spinus magellanicus*)**

Pequenos bandos alimentando-se e machos cantando na área da sede.

**CAIS-CAIS (*Euphonia chalybea*)**

Observado no Mirante da Cascata da Usina e também em frente ao alojamento principal, onde se alimentava dos pseudofrutos do pinheiro-bravo (*Podocarpus lambertii*).

**BANDEIRINHA (*Chlorophonia cyanea*)**

Ouvido em frente ao alojamento principal, corresponde ao primeiro registro feito pelo COA na FLONA.

## **OUTRA FAUNA OBSERVADA**

### **BUGIO-RÚIVO (*Alouatta guariba clamitans*) – AM**

Um grupo com quatro indivíduos foi visto no caminho para a Cascata Bolo de Noiva. O grupo estava em pinus bem altos e se deslocavam de uma árvore a outra.

### **CUTIA (*Dasyprocta azarae*) – AM**

Cutias foram avistadas na Estrada Geral, em frente ao Açude do Aguapé, quase na chegada aos alojamentos, onde existem castanheiras das quais provavelmente elas se alimentam.

### **GRAXAIM-DO-MATO (*Cerdocyon thous*)**

Na noite do dia 07 um indivíduo foi rapidamente visto enquanto fazíamos *playback* para corujas, na Estrada Geral da FLONA.

### **LAGARTO-TEIÚ (*Salvator merianae*)**

Estes lagartos estavam constantemente na volta do alojamento, principal durante as horas mais quentes do dia. Buscavam por restos de alimento e, por vezes, brigavam pela disputa de território. Em uma ocasião dois indivíduos se aproximaram sem conflitos, parecendo se tratar de um casal.

### **Lista dos participantes (em ordem alfabética):**

Andrew Whittaker	Morci Schmidt
Astor Gabriel	Rafael Sgari
Edenice Brandão de Ávila	Roberto Dall'Agnol
Eduardo Chiarani	Samuel Oliveira
Gilberto Muller	Sônia Benedetto
Jaqueline Fortuna	Veridiana Tamiozzo
Jurema Josefa Silva	Wilson Mallman
Marisa Costa	

(Compilado por Eduardo Chiarani, com a colaboração de Gilberto Muller. Textos sobre a FLONA retirados do relatório do COA de 2015).

## ANEXO FOTOGRÁFICO





Araponga (*Procnias nudicollis*) macho. Foto: Wilson Mallmann



Caneleirinho-de-boné-preto (*Piprites pileata*) fêmea. Foto: Eduardo Chiarani



Da esquerda para a direita e de cima para baixo: coruja-listrada (Foto de Roberto Dall Agnol), corujinha-do-sul, limpa-folha-de-testa-baia, tecelão adulto (à esquerda) alimentando um jovem, fêmea de matracão (Fotos de Wilson Mallmann) e macho de matracão (Foto de Andrew Whittaker).



Da esquerda para a direita e de cima para baixo: catraca (Foto de Roberto Dall Agnol), choca-da-mata e tiriba-de-testa-vermelha (Fotos de Gilberto Muller), gralha-azul e chupa-dente (Fotos de Andrew Whittaker), pica-pau-anãocarijó (Foto de Veridiana Tamiozzo).



Foto oficial do grupo na Flona. Foto: Gilberto Muller



Grupo na cachoeira Bolo de Noiva. Foto: Roberto Dall Agnol