

Relatório das saídas realizadas durante o *Global Big Day*

No dia 14 de maio de 2016 o COA-POA realizou duas saídas a campo para participar do dia mundial de observação de aves, o *Global Big Day*. Um grupo com seis participantes foi para o Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos (RVSBP), em Viamão, enquanto outro grupo, com quatro participantes, foi para Morro Reuter (MR) e Santa Maria do Herval (SMH). As condições climáticas estavam muito boas, com predomínio de sol, pouco vento e temperatura amena, o que favoreceu as observações. No total os dois grupos de observadores registraram 142 espécies ao longo do dia (102 no RVSBP e 68 em MR/SMH – ver listas abaixo). As listas de espécies foram enviadas para o eBird, no intuito de colaborar para o banco de dados do *Global Big Day* (www.ebird.org/ebird/globalbigday).

No RVSBP foram percorridas duas trilhas. Pela manhã o grupo fez as observações na trilha do cervo, atrás da sede do refúgio, onde se destacam ambientes de campo seco e mata nativa. Neste local podemos citar como destaques das observações a visualização de dois indivíduos de sacis (*Tapera naevia*), fato incomum de acontecer com essa ave arisca e difícil de ser observada. Também chamou a atenção o fato de um gavião-de-rabo-branco (*Geranoaetus albicaudatus*) estar pousado no mesmo local de anos anteriores (em um jerivá), porém solitário desta vez. À tarde os participantes foram até a barragem e percorreram a trilha da “taipa”. Neste ponto o ambiente aquático predomina e grandes bandos de aves aquáticas puderam ser observados, a exemplo de marrecas-piadeiras (*Dendrocygna viduata*) e cabeças-seca (*Mycteria americana*). Destacamos, também, a observação de um pequeno bando com quatro indivíduos de noivinha-de-rabo-preto (*Xolmis dominicanus*), espécie ameaçada de extinção.

No Município de MR foram percorridas duas estradas de terra em meio a fragmentos de Mata-Atlântica, na Localidade de Linha Cristo Rei com altitude acima de 600 metros do nível do mar e outra descendo até o Rio Loch na localidade de Walachai. Na localidade de Linha Cristo Rei, observamos um grande bando misto, com espécies como: choquinha-lisa (*Dysithamnus mentalis*), arredio-oliváceo (*Cranioleuca obsoleta*), choquinha-carijó (*Drymophila malura*), bico-virado-carijó (*Xenops rutilans*), arapaçu-verde (*Sittasomus griseicapillus*), pichororé (*Synallaxis ruficapilla*), trepadorzinho (*Heliobletus contaminatus*) mariquita (*Setophaga pitayumi*) e pula-pula (*Basileuterus culicivorus*). O destaque foi para uma vocalização do Irré (*Myiarchus swainsoni*) ave migratória incomum no estado nessa época do ano. Após o grupo seguiu até o centro de Walachai onde havia uma árvore de caqui com frutos onde podemos observar o sabiá-laranjeira (*Turdus rufiventris*), sabiá-coleira (*Turdus albicollis*), tucano-de-bico-verde (*Ramphastos dicolorus*) se alimentando. O grupo seguiu até o Rio Loch, divisa com SMH, onde percorremos uma trilha em meio aos Morros e os destaques foram a borralhara (*Mackenziaena severa*), ave com poucos registros para o estado e que está ameaçada de extinção, e o pica-pau-dourado (*Piculus aurulentus*), o qual estava no mesmo local onde em outras saídas do COA foi observado, próximo a um ninho.

Compilado por Eduardo Chiarani, Cesar Santos e Roberto Dall’Agnol.

**Aves observadas na saída de campo do COA-POA
de 14 de maio de 2016 durante o *Global Big Day***

Local: Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos

Data e horário: 14/05/2016, das 8h às 17h

Condições do tempo: Sol sem nuvens e pouco vento. Temperatura em torno de 20°C

Número de participantes: 06

Total de espécies registradas: 102

Lista das espécies:

Nome científico	Nome em Português
<i>Nothura maculosa</i>	perdiz
<i>Chauna torquata</i>	tachã
<i>Dendrocygna bicolor</i>	marreca-caneleira
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	pé-vermelho
<i>Ortalis squamata</i>	aracuã-escamoso
<i>Podilymbus podiceps</i>	mergulhão
<i>Ciconia maguari</i>	joão-grande
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca
<i>Nannopterum brasilianus</i>	biguá
<i>Tigrisoma lineatum</i>	socó-boi
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura
<i>Ardea alba</i>	garça-branca-grande
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena
<i>Plegadis chihi</i>	maçarico-preto
<i>Phimosus infuscatus</i>	maçarico-de-cara-pelada
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta
<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro
<i>Geranoaetus albicaudatus</i>	gavião-de-rabo-branco
<i>Aramus guarauna</i>	carão
<i>Aramides ypecaha</i>	saracuruçu

<i>Pardirallus sanguinolentus</i>	saracura-do-banhado
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
<i>Gallinago paraguaiiae</i>	narceja
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha-roxa
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picui
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão
<i>Zenaida auriculata</i>	pomba-de-bando
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto
<i>Guira guira</i>	anu-branco
<i>Tapera naevia</i>	saci
<i>Streptoprocne sp.</i>	andorinhão
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo
<i>Caracara plancus</i>	caracará
<i>Milvago chimango</i>	chimango
<i>Falco sparverius</i>	quiriquiri
<i>Myiopsitta monachus</i>	caturrita
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-chapéu-vermelho
<i>Thamnophilus caeruleus</i>	choca-da-mata
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete
<i>Anumbius annumbi</i>	cochicho
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	bichoita
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta
<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i>	tororó
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha
<i>Elaenia flavogaster</i>	guaracava-de-barriga-amarela
<i>Elaenia obscura</i>	tucão
<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro
<i>Hymenops perspicillatus</i>	viuvinha-de-óculos
<i>Satrapa icterophrys</i>	suiriri-pequeno
<i>Xolmis irupero</i>	noivinha

<i>Xolmis dominicanus</i>	noivinha-de-rabo-preto
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari
<i>Alopochelidon fucata</i>	andorinha-morena
<i>Tachycineta leucorrhoa</i>	andorinha-de-sobre-branco
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra
<i>Turdus amaurochalinus</i>	sabiá-poca
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo
<i>Anthus lutescens</i>	caminheiro-zumbidor
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico
<i>Ammodramus humeralis</i>	tico-tico-do-campo
<i>Setophaga pitiayumi</i>	mariquita
<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	pia-cobra
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador
<i>Amblyramphus holosericeus</i>	cardeal-do-banhado
<i>Agelasticus thilius</i>	sargento
<i>Pseudoleistes guirahuro</i>	chopim-do-brejo
<i>Pseudoleistes virescens</i>	dragão
<i>Agelaioides badius</i>	asa-de-telha
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro
<i>Coryphospingus cucullatus</i>	tico-tico-rei
<i>Paroaria coronata</i>	cardeal
<i>Donacospiza albifrons</i>	tico-tico-do-banhado
<i>Microspingus cabanisi</i>	quete
<i>Sicalis flaveola</i>	canário-da-terra-verdadeiro
<i>Sicalis luteola</i>	tipio
<i>Emberizoides herbicola</i>	canário-do-campo
<i>Emberizoides ypiranganus</i>	canário-do-brejo
<i>Embernagra platensis</i>	sabiá-do-banhado
<i>Volatinia jacarina</i>	tiziu
<i>Euphonia chlorotica</i>	fim-fim
<i>Passer domesticus</i>	pardal



Xolmis dominicanus (noivinha-de-rabo-preto) macho. Foto: Eduardo Chiarani



Hymenops perspicillatus (viuvinha-de-óculos) fêmea. Foto: Eduardo Chiarani



Bando de *Mycteria americana* (cabeça-seca). Foto: Eduardo Chiarani



Geranoaetus albicaudatus (gavião-de-rabo-branco). Foto: Eduardo Chiarani

Lista dos participantes (em ordem alfabética):

Antônio Coimbra de Brum

Eduardo Chiarani

Fernando de Miranda Ramos

Kleber Pinto Antunes de Oliveira

Osmar Sehn

Rosane Vera Marques

Local: Morro Reuter e Santa Maria do Herval

Data e horário: 14/05/2016, das 7:45h às 14:45h

Condições do tempo: pouca neblina pela manhã, sol e tempo aberto no restante do dia.

Número de participantes: 04

Total de espécies registradas: 68

Lista das espécies:

Nome científico	Nome em Português
<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena
<i>Phimosus infuscatus</i>	maçarico-de-cara-pelada
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato
<i>Florisuga fusca</i>	beija-flor-preto
<i>Stephanoxis loddigesii</i>	beija-flor-de-topete-azul
<i>Chlorostilbon lucidus</i>	besourinho-de-bico-vermelho
<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta
<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde
<i>Picumnus temminckii</i>	pica-pau-anão-de-coleira
<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-dourado
<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa
<i>Thamnophilus caeruleus</i>	choca-da-mata
<i>Batara cinerea</i>	matracão
<i>Mackenziaena leachii</i>	brujarara-assobiador
<i>Mackenziaena severa</i>	borralhara
<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde
<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	arapaçu-grande
<i>Xenops rutilans</i>	bico-virado-carijó
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro
<i>Philydor rufum</i>	limpa-folha-de-testa-baia

<i>Heliobletus contaminatus</i>	trepadorzinho
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé
<i>Synallaxis cinerascens</i>	pi-puí
<i>Cranioleuca obsoleta</i>	arredio-oliváceo
<i>Chiroxiphia caudata</i>	dançador
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim
<i>Carpornis cucullata</i>	corocochó
<i>Platyrinchus mystaceus</i>	patinho
<i>Mionectes rufiventris</i>	abre-asa-de-cabeça-cinza
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato
<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	bico-chato-de-orelha-preta
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó
<i>Camptostoma obsoletum</i>	risadinha
<i>Myiarchus swainsoni</i>	irré
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari
<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul
<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	andorinha-pequena-de-casa
<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra
<i>Turdus rufiventris</i>	sabiá-laranjeira
<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira
<i>Mimus saturninus</i>	sabiá-do-campo
<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico
<i>Setophaga pitaiayumi</i>	mariquita
<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula
<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador
<i>Cacicus chrysopterus</i>	tecelão
<i>Coereba flaveola</i>	cambacica
<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro
<i>Pyrrhocomma ruficeps</i>	cabecinha-castanha
<i>Tangara sayaca</i>	sanhaçu-cinzento
<i>Pipraeidea melanonota</i>	saíra-viúva
<i>Dacnis cayana</i>	saí-azul
<i>Microspingus cabanisi</i>	quete
<i>Euphonia pectoralis</i>	ferro-velho



Mackenziaena severa (borralhara) macho.
Foto: Roberto Dall'Agnol



Piculus aurulentus (pica-pau-dourado) macho.
Foto: Roberto Dall'Agnol



Synallaxis ruficapilla (pichororé).
Foto: Roberto Dall'Agnol



Xenops rutilans (bico-virado-carijó)
Foto: Cesar Santos

Lista dos participantes (em ordem alfabética):

Cesar Rodrigo dos Santos

Cyro Menezes da Glória

Helena Backes

Roberto Dall'Agnol