



Wilson Mallmann

INTRODUÇÃO e RELATO

De 25 a 28 de fevereiro de 2017, realizamos a sétima edição da já tradicional saída de carnaval do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre (COA-POA) à Floresta Nacional de São Francisco de Paula (FLONA). A FLONA é uma unidade de conservação (UC) de uso sustentável administrada pelo ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, localizada no município de mesmo nome, na região nordeste do Rio Grande do Sul.

A superfície da FLONA é de 1.606 ha e as altitudes giram em torno dos 900 metros. A área protege importantes remanescentes de floresta ombrófila mista (mata com araucária), entremeados com antigos plantios de araucária, pinheiros exóticos e eucalipto. Está situada na borda oriental do Planalto das Araucárias, no topo da chamada Serra Geral.

As observações foram realizadas principalmente no interior da unidade de conservação e também em um trecho de 3 km na estrada de acesso à unidade. O tempo se manteve com sol em todas as saídas, com temperatura média de 25°C e ventos brandos.

Registramos ao todo 90 espécies de aves, divididas em 37 famílias. Destas, 20 foram observadas fora dos limites da FLONA, bem próximas, uma vez que o grupo fez apenas uma saída externa e próxima ao portão de entrada da Unidade. O baixo número de espécies registradas, em relação às saídas

anteriores, se deve, em parte, que nesta saída não teve o acompanhamento de ornitólogo com apurada experiência em aves de florestas, especialmente, na identificação das aves pela vocalização, como é o costume de nossas saídas de campo. Outro fator, que também deve ter contribuído para o baixo número de registros, foi a época da saída, final de fevereiro, onde muitas aves já concluíram o período reprodutivo e estão mais silenciosas.

Vale lembrar que o forte temporal ocorrido na região, semanas antes da saída, causou distúrbio à avifauna, sendo este o caso das Curicacas, que tiveram todos os filhotes perdidos, como relatou um funcionário da unidade.

No entanto, foram realizados registros fotográficos importantes como do Tapaculo-preto (*Scytalopus speluncae*), vistos por três integrantes do grupo (Wilson, Bjørn e Jair) do qual rendeu boas fotos feitas pelos mesmos; Tesourinha-da-mata (*Phibalura flavirostris*), visto apenas um indivíduo, na sede, que não escapou dos olhos atentos de Bjorn e de sua câmara; Inhambuguaçu (*Crypturellus obsoletus*) realizado registro fotográfico por Bjorn e Wilson. Um indivíduo de Tiríbia-de-testa-vermelha (*Pyrrhura frontalis*), em tons azuis acinzentado, tido como híbrido da espécie, e fotografado pelo Bjørn.

Os demais registros estão listados abaixo. Excepcionalmente no relatório deste ano, por questões técnicas, deixaremos de indicar o local do registro, informando apenas se foi registrado dentro da unidade ou fora.

A sequência sistemática e os nomes científicos seguem a última lista do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (Piacentini et al. 2015)¹. Os nomes populares estão de acordo com a lista das aves do RS (Bencke et al. 2010)².

Destacamos ainda que, foram observadas três espécies de mamíferos silvestres (lista abaixo). No caso do veado-virá, pequeno cervídeo, chamou a atenção o número de observações (3), observado em diferentes horários, no almoço, e duas ao anoitecer, sempre perto dos alojamentos.

Por fim cabe lembrar que as jantas preparadas pelo Odiombar ficarão na memória dos 9 participantes dessa saída de campo. Não só pela criatividade da apresentação dos pratos, mas também pelo sabor e criatividade para preparar os alimentos com tão poucos ingredientes.

Agradecemos ao pessoal da Flona que nos recebeu muito bem, em especial a gestora Edenice, pela paciência em esperar os retardatários que se perderam na estrada.

¹ Piacentini et al. (2015). Lista comentada das aves do Brasil pelo Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Revista Brasileira de Ornitologia, 23(2):91-298.

² Bencke et al. (2010). Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul, Brasil. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, 100(4):519-556.

ITINERÁRIO e CONSIDERAÇÕES

Sábado, 25 de fevereiro

O grupo se reuniu por volta das 13:00 horas na FLONA, em razão de alguns imprevistos ocorridos no deslocamento. Neste primeiro dia foi percorrido parte da Estrada Circular e Trilha Mirante Cascata da Usina. Na volta à sede, ao final da tarde, o grupo encontrou participantes do Clube de Observadores de Aves de Santo Ângelo - Aves Missões, que estavam chegando à Flona, para observações no dia seguinte. À noite teve churrasco e após saída para observação de corujas.

Domingo, 26 de fevereiro

Pela parte da manhã, alguns membros do grupo, que gostariam de observar o Eclipse solar, que ocorreria neste dia, fizeram observações próximas à sede e 3 integrantes percorreram a Trilha das Araucárias. Na parte da tarde foi percorrida a Trilha Cascata Bolo da Noiva. À noite antes da janta foi feita outra saída para observação de corujas.

Segunda-feira, 27 de fevereiro

Na parte da manhã foi realizada saída na parte externa da Flona, na estrada de acesso à unidade. No retorno, um pequeno grupo percorreu a Trilha Araucárias Centenárias. Na parte da tarde, foi percorrida parte da Estrada Tena Silva. Durante a noite foi feita corujada e 4 integrantes do grupo aproveitaram o céu limpo da noite para fotografar a via-láctea.

Terça-feira, 28 de fevereiro

Os integrantes deixaram a Flora cedo tendo como objetivo visitar uma torre de observação de aves, localizada na cidade de São Francisco de Paula, na propriedade do Sr. Hannes Jr. Gutschwager, o qual tinha convidado o grupo e gentilmente nos recebeu em sua casa. Nesta torre, é possível observar aves em vários substratos da floresta, chegando a ultrapassar as copas das árvores.

Ao final deste passeio o grupo retornou à Porto Alegre.

ESPÉCIES REGISTRADAS

Família	Nome Científico	Nome Popular e Observações
Tinamidae	<i>Crypturellusobsoletus</i> (Temminck,1815)	inambuguaçu
Cracidae	<i>Penelope obscura</i> Temminck, 1815	jacuguaçu
Ardeidae	<i>Ardeaalba</i> (Linnaeus,1758)	garça-branca-grande

Threskiornithidae	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	curicaca
Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i> (Bechsteins,1793)	urubu-de-cabeça-preta
	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-de-cabeça-vermelha
Accipitridae	<i>Accipiter striatus</i> (Vieillot,1808)	gaviãozinho
	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin,1788)	gavião-carijó
Falconidae	<i>Milvago chimango</i> (Vieillot, 1816)	Chimango
Rallidae	<i>Pardirallus sanguinolentus</i> (Swainson,1837)	saracura-do-banhado
Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	quero-quero Obs. Dentro e fora da Flona.
Columbidae	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs,1847)	pomba-de-bando
	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonaparte, 1792)	pomba-galega
	<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	juriti-pupu
Psittacidae	<i>Pyrrhura frontalis</i> (Vieillot, 1817)	tiriba-de-testa-vermelha
	<i>Pionopsitta pileata</i> (Scopoli, 1769)	cuiú-cuiú
	<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica
	<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	papagaio-de-peito-roxo Obs.Papagaio-de-peito-roxo, visualização muito próxima da Flona
Strigidae	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	corujinha-do-mato
	<i>Megascops sanctaecatarinae</i> (Salvin, 1897)	corujinha-do-sul
	<i>Strix hylophila</i> (Temminck ,1825)	coruja-listrada
Apodidae	<i>Streptoprocne zonaris</i> (Shaw, 1796)	andorinhão-de-coleira-branca
Trochilidae	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	beija-flor-de-frente-violeta
	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	besourinho-de-bico-vermelho
	<i>Stephanoxis loddigesii</i> (Gould, 1831)	beija-flor-de-topete
Trogonidae	<i>Trogon surrucura</i> (Vieillot, 1817)	surucuá-variado
Ramphastidae	<i>Ramphastos dicolorus</i> (Linnaeus, 1766)	tucano-de-bico-verde
Picidae	<i>Piculus aurulentus</i> (Temminck, 1821)	pica-pau-dourado
	<i>Picumnus nebulosus</i> Sundevall, 1866	picapauzinho-carijó
	<i>Colaptes campestris</i> (Vieillot, 1818)	pica-pau-do-campo Obs.For e dentro da Flona
	<i>Colaptes melanochloros</i> (Gmelin, 1788)	pica-pau-verde-barrado
Thamnophilidae	<i>Thamnophilus ruficapillus</i> (Vieillot, 1816)	choca-de-boné-vermelho
	<i>Thamnophilus caerulescens</i> (Vieillot, 1816)	choca-da-mata
	<i>Batara cinerea</i> (Vieillot, 1819)	matracão
Rhinocryptidae	<i>Scytalopus speluncae</i> (Ménétriés, 1835)	tapaculo-preto
Grallariidae	<i>Hylopezus nattereri</i> (Pinto, 1937)	pinto-do-mato

	<i>Chamaeza campanisona</i> (Lichtenstein, 1823)	tovaca-campanhia
Dendrocolaptidae	<i>Sittasomus griseicapillus</i> (Vieillot, 1818)	arapaçu-verde
	<i>Lepidocolaptes falcinellus</i> (Cabanis&Eine, 1859)	arapaçu-escamoso-do-sul
	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i> (Spix, 1825)	arapaçu-grande
Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i> (Gmelin,1788)	joão-de-barro
	<i>Syndactyla rufosuperciliata</i> (Lafresnaye, 1832)	trepador-quiete
	<i>Synallaxis spixi</i> (Sclater, 1856)	joão-teneném Obs. Fora da Flona.
	<i>Leptasthenura setaria</i> (Temminck, 1824)	grimpeiro
	<i>Cinclodes pabsti</i> ((Sick, 1969)	pedreiro Obs. Fora da Flona.
	<i>Limnoctites rectirostris</i> (Gould, 1839)	arredio-do-gravatá Obs.For a Flona.
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga ou ferreiro
	<i>Philabura flavirostris</i> (Vieillot, 1816)	tesourinha-da-mata
Platyrrhynchidae	<i>Platyrrhynchus mystaceus</i> (Vieillot,1818)	patinho
Rhyocyclidae	<i>Phylloscartes ventralis</i> (Temminck, 1824)	borboletinha-do-mato
	<i>Hemitriccus obsoletus</i> (Miranda-Ribeiro, 1906)	catraca
	<i>Tolmomyias sulphureus</i> (Spix, 1825)	bico-chato-de-orelha-preta
Tyrannidae	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	risadinha
	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	guaracava-de-barriga-amarela
	<i>Elaenia parvirostris</i> (Pelzeln, 1868)	guaracava-de-bico-curto
	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	bem-te-vi-rajado
	<i>Empidonomus varius</i> (Vieillot, 1818)	Peitica
	<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)	Suiriri
	<i>Knipolegus cyanirostris</i> (Vieillot, 1818)	maria-preta-bico-azulado Obs. Fora da Flona.
	<i>Tyrannus savana</i> ((Vieillot, 1808)	tesourinha Obs.For a Flona.
	<i>Xolmis dominicanus</i> (Vieillot,18123)	noivinha-de-rabo-preto Obs. Quase na entrada da FLONA(Pórtico)
Vireonidae	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	pitiguari ou gente-de-fora-vem
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> (Vieillot, 1818)	gralha-azul
Hirundinidae	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-pequena-de-casa
	<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-do-campo
	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	andorinha-de-sobre-acanelado Obs. fora da Flona.
Troglodytidae	<i>Troglodytes musculus</i> (Naumann, 1823)	corruíra Obs.For a Flona.

Turdidae	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	sabiá-laranjeira
Mimidae	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	sabiá-do-campo Obs. Fora da FLONA, mas muito.
Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	tico-tico
	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	tico-tico-do-campo Obs. Fora da Flona.
Tharaupidae	<i>Tangara preciosa</i> (Cabanis, 1850)	Saíra-preciosa
	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	saíra-viuva
	<i>Saltator similis</i> (d'Orbigny&Lafresnaye, 1837)	trinca-ferro-verdadeiro
	<i>Donacospiza albifrons</i> (Vieillot, 1817)	tico-tico-do-banhado Obs. Fora da Flona.
	<i>Microspingus cabanisi</i> (Bonaparte, 1850)	Quete
	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	canário-da-terra-verdadeiro
	<i>Sicalis luteola</i> (Sparrman, 1789)	tipio
	<i>Poospiza nigrorufa</i> (d'Orbigny&Lafresnaye, 1837)	quem-te-vestiu
	<i>Embernagra platensis</i> (Gmelin, 1789)	sabiá-do-banhado Obs. Fora da Flona.
	<i>Sporophila caerulescens</i> (Vieillot, 1823)	coleirinho Obs. Fora da Flona.
	<i>Sporophila melanogaster</i> (Pelzeln, 1870)	caboclinho-de-barriga-preta Obs. Fora da Flona.
Parulidae	<i>Setophaga pitiayumi</i> (Vieillot, 1817)	mariquita
	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	pia-cobra Obs. Fora da Flona.
	<i>Basileuterus culicivorus</i> (Deppe, 1830)	pula-pula
	<i>Myiothlypis leucoblephara</i> (Vieillot, 1817)	pula-pula-assobiador
Icteridae	<i>Cacicus chrysopterus</i> (Vigors, 1825)	tecelão
	<i>Molothrus bonariensis</i> (Vieillot, 1819)	vira-bosta
	<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	chopim-do-brejo Obs. Fora da Flona.
Fringillidae	<i>Spinus magellanicus</i> (Vieillot, 1805)	pintassilgo Obs. Fora da Flona.

Mastofauna

Família	Nome Científico	Nome Popular
Cricetidae	<i>Oligoryzomy ssp.</i> Obs. Provavelmente <i>Oligoryzomys flavescens</i>	camundongo-do-mato
Cervidae	<i>Mazama gouazoubira</i>	veado-virá
Mustelidae	<i>Eira barbara</i>	irara

(Copilado por Antônio Brum, com a colaboração de Kleber Pinto Oliveira)

Lista dos participantes

Antônio Coimbra de Brum
Armando Molina Divan Junior
Bjoern-Einar Nilsen
Jair Gilberto Kray
Kleber Pinto Antunes de Oliveira
Ligia Maria de Godoy Rodrigues
Lourenço Berges Divan
Mateus Rhoden
Odiombar do Amaral
Wilson Mallmann



ANEXO FOTOGRÁFICO

tapaculo-preto (*Crypturellusobsoletus*)



inambuguaçu (*Crypturellusobsoletus*)



bem-te-vi-rajado (*Myiodynastes maculatus*)



tiriba-de-testa-vermelha (*Pyrrhura frontalis*)



veado-virá (*Mazama gouazoubira*)

