

Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos

04 de março de 2018



No dia 04 de março de 2018, o Clube de Observadores de aves de Porto Alegre – COA-POA realizou sua primeira saída de campo do ano para observação no Refúgio de Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, em Viamão, RS. Nessa região se localizam as nascentes do rio Gravataí, um dos afluentes do rio Guaíba. A área de preservação citada possui 2.500 hectares.

Geralmente são percorridas duas trilhas para a observação das aves na Unidade: a Trilha da Barragem que possui várias áreas alagadas, sendo uma zona de planície, com banhados de vegetação baixa, apresentando poucas árvores, todas de pequeno porte e a Trilha do Cervo que está situada numa zona mais elevada, há uma área menor de banhados e mais matas baixas (de restinga), o que possibilita, em parte, a presença de uma avifauna diferente daquela presente na Trilha da Barragem.

No entanto, nesta saída, em razão da chuva na parte da tarde e do baixo número de participantes, nove no total, não foi possível percorrer a Trilha do Cervo, o que repercutiu no baixo número de registros em comparação com as relações de registros dos anos anteriores. Foram registradas 83 espécies de aves durante a presente saída.

Mesmo assim, foi uma excelente saída com registros importantes e inéditos para o COA-POA e para a Unidade de Conservação, demonstrando a importância dessa área de proteção ambiental para as aves e o estímulo da atividade de observação de aves.

As condições climáticas pela manhã estavam boas, embora o sol forte tenha prejudicado um pouco a observação e alguns participantes retornaram mais cedo da trilha.

OBSERVAÇÕES RELEVANTES

O registro mais importante desta saída foi o do Caboclinho-branco (*Sporophila pileata*), tratando-se de um dos primeiros registros desta espécie, confirmada, para o RVSBP. Foi registrado um casal alimentando-se próximo ao meio-dia, com sol forte, sem vento, temperatura em torno de 34°C. Foi, também, o primeiro registro da espécie para o COA-POA (*lifer*).

Outro registro importante para o Banhado dos Pachecos foi a presença do maçarico-grande-de-perna-amarela (*Tringa melanoleuca*), que também não consta na lista das aves registradas na unidade. Vale a pena destacar a presença de um fêmea da Noivinha-de-rabo-preto (*Xolmis dominicanus*) e o registro de um bando de 8 indivíduos de Cabeça-seca (*Mycteria americana*), junto com 5 colhereiros (*Platalea ajaja*).

Chamou a atenção dos observadores o baixo número de marrecas Irerês (*Dendrocygna viduata*), sempre abundantes no local, mas desta vez avistados apenas 3 indivíduos. Em contrapartida, foi registrado um número considerável de socozinhos jovens (*Butorides striata*), 9 indivíduos no total.

Como sempre, os cardeais-do-banhado (*Amblyramphus holosericeus*) alegraram os olhos dos participantes. Foram avistados 4 indivíduos jovens e 3 adultos.

Por fim, vale destacar o registro da Freirinha (*Arundinicola leucocephala*), que não havia sido registrada nas duas últimas saídas do Coa/Poa.

LISTA DOS PARTICIPANTES EM ORDEM ALFABÉTICA

Antônio Coimbra de Brum	Lígia Rodrigues
Augusto Potter	Robson Schuler
Cássio José Pereira da Silva	Odiombar Rodrigues
Glauco Magalhães Pereira	Vanessa Canabarro
Ines Anhaia Vasconcelos	

LISTA DAS AVES AVISTADAS

A sequência sistemática e os nomes científicos e em português seguem Bencke, G. A.; Dias, R. A.; Bugoni, L.; Agne, C. E.; Fontana, C. S.; Maurício, G. N. e Machado, D. 2010. Revisão e atualização da lista das aves do Rio Grande do Sul, Brasil. *Iheringia*, sér. Zool., 100(4):519–556

FAMÍLIA/NOME CIENTÍFICO	NOME COMUM
Anhimidae	
<i>Chauna torquata</i>	tachã
Anatidae	
<i>Dendrocygna viduata</i>	irerê
<i>Amazonetta brasiliensis</i>	ananaí
Ciconiidae	
<i>Ciconia maguari</i>	maguari
<i>Mycteria americana</i>	cabeça-seca
Ardeidae	
<i>Ardea cocoi</i>	garça-moura
<i>Ardea alba</i>	garça-branca
<i>Syrigma sibilatrix</i>	maria-faceira
<i>Bubulcus ibis</i>	garça-vaqueira

<i>Egretta thula</i>	garça-branca-pequena
<i>Butorides striata</i>	socozinho
Threskiornithidae	
<i>Plegadis chihi</i>	caraúna
<i>Phimosus infuscatus</i>	tapicuru
<i>Platalea ajaja</i>	colhereiro
Cathartidae	
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
<i>Cathartes burrovianus</i>	urubu-de-cabeça-amarela
Accipitridae	
<i>Circus buffoni</i>	gavião-do-banhado
<i>Heterospizias meridionalis</i>	gavião-caboclo
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó
<i>Rostrhamus sociabilis</i>	gavião-caramujeiro
Rallidae	
<i>Laterallus melanophaius</i>	sanã-parda
<i>Aramides ypecaha</i>	Saracuruçu
Charadriidae	
<i>Vanellus Chilensis</i>	quero-quero
Scolopacidae	
<i>Tringa melanoleuca</i>	maçarico-grande-de-perna-amarela
Jacanidae	
<i>Jacana jacana</i>	jaçanã
Columbidae	
<i>Columbina talpacoti</i>	rolinha
<i>Columbina picui</i>	rolinha-picuí
<i>Patagioenas picazuro</i>	asa-branca
<i>Zenaida auriculata</i>	avoante
Cuculidae	
<i>Crotophaga ani</i>	anu-preto
<i>Guira guira</i>	anu-branco
Strigidae	
<i>Athene cunicularia</i>	coruja-buraqueira
Apodidae	
<i>Streptoprocne zonalis</i>	taperuçu-de-coleira-branca
<i>Streptoprocne biscutata</i>	taperuçu-de-coleira-falha
Trochilidae	
<i>Hylocharis chrysura</i>	beija-flor-dourado
Alcedinidae	
<i>Chloroceryle amazona</i>	martim-pescador-verde
Picidae	
<i>Colaptes campestris</i>	pica-pau-do-campo
Falconidae	
<i>Milvago chimango</i>	chimango
<i>Falco sparverius</i>	quiri-quiri
Thamnophilidae	
<i>Thamnophilus ruficapillus</i>	choca-de-chapéu-vermelho
Furnariidae	
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro
<i>Schoeniophylax phryganophilus</i>	bichoita
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>	curutié
<i>Anumbius anumbi</i>	cochicho
<i>Synallaxis spixi</i>	joão-teneném
Tyrannidae	
<i>Serpophaga nigricans</i>	joão-pobre
<i>Serpophaga subcristata</i>	alegrinho
<i>Pitangus sulphuratus</i>	bem-te-vi
<i>Machetornis rixosa</i>	suiriri-cavaleiro

Tyrannus melancholicus
Arundinicola leucocephala
Xolmis irupero
Xolmis dominicanus
Elaenia obscura

Hirundinidae

Pygochelidon cyanoleuca
Alopocheilidon fucata
Progne tapera
Progne chalybea

Troglodytidae

Troglodytes musculus

Turdidae

Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus

Mimidae

Mimus saturninus

Passerellidae

Zonotrichia capensis
Ammodramus humeralis

Parulidae

Geothlypis aequinoctialis

Icteridae

Amblyramphus holosericeus
Agelasticus thilius
Chrysomus ruficapillus
Pseudoleistes guirahuro
Pseudoleistes virescens
Agelaioides badius
Molothrus bonariensis
Sturnella supercilialis

Thraupidae

Paroaria coronata
Sicalis flaveola
Sicalis luteola
Volatinia jacarina
Sporophila pileata
Sporophila collaris
Sporophila caerulea
Embernagra platensis
Emberizoides ypiranganus
Donacospiza albifrons

Passeridae

Passer domesticus

suiriri
freirinha
noivinha
noivinha-de-rabo-preto
tucão

andorinha-pequena-de-casa
andorinha-morena
andorinha-do-campo
andorinha-doméstica-grande

corruíra

sabiá-laranjeira
sabiá-poca

sabiá-do-campo

tico-tico
tico-tico-do-campo

pia-cobra

cardeal-do-banhado
sargento
garibaldi
chopim-do-brejo
dragão
asa-de-telha
chupim
polícia-inglesa-do-sul

cardeal
canário-da-terra
tipio
tiziu
caboclinho-branco
coleiro-do-brejo
coleirinho
sabiá-do-banhado
canário-do-brejo
tico-tico-do-banhado

pardal

Número de famílias
Número de espécies

31
83 identificadas

ANEXO FOTOGRÁFICO



caboclinho-branco (*Sporophilapileata*)



choca-de-chapéu-vermelho (*Thamnophilus ruficapillus*)



maçarico-grande-de-perna-amarela (*Tringamelanoleuca*), à esquerda.



cabeça-seca (*Mycteria americana*)



Tachã (*Chaunatorquata*)



Foto: Ines Vasconcelos

Inesvasconcelos

freirinha (*Arundinicolaleucocephala*)



Foto: Glauco Magalhães

Grupo de observadores



Foto: Glauco Magalhães



noivinha-de-rabo-preto (*Xolmis dominicanus*)

Relatório elaborado por Antônio C. Brum e Eduardo Chiarani.