

Morro Reuter e Santa Maria do Herval

08 de julho de 2018



Participantes da saída na ponte do rio Loch, divisa entre Morro Reuter e Sta. Maria do Herval.
Foto: Eduardo Chiarani

No dia 08 de julho de 2018, o Clube de Observadores de aves de Porto Alegre – COA/POA realizou sua quarta saída de campo oficial para observação de aves nos municípios de Morro Reuter (MR) e Santa Maria do Herval (SMH). O local é formado por morros que chegam a altitudes de pouco mais de 600 m, com áreas remanescentes consideráveis de Mata Atlântica.

Após o encontro dos sete participantes na entrada de Ivoti, na BR-116, o grupo seguiu até o Rio Loch, divisa entre MR e SMH. Partindo do Balneário do rio Loch, percorremos cerca de 2,5 km pela estrada de terra em meio aos morros, pelo lado direito do rio (que fica em SMH). Retornamos por volta do meio-dia até o ponto de partida, onde foi feito um lanche. A manhã foi toda de céu encoberto e muita neblina no topo dos morros. A temperatura estava baixa e o vento aumentava a sensação de frio. No entanto, a previsão de chuva (que prejudicou um pouco nas inscrições na saída) não se confirmou e não foi preciso usar as capas ou guarda-chuvas.

À tarde o grupo se deslocou até o alto do morro onde fica a antena da Embratel, em Morro Reuter. Lá existe um mirante com uma ampla visão da cidade vizinha (Dois Irmãos) e outras um pouco mais afastadas (Sapiranga, Novo Hamburgo).

No total registramos 57 espécies de aves durante a saída (lista abaixo), número inferior ao observado em saídas anteriores à região. Em outubro de 2013 foram registradas 84 espécies, em abril de 2015 foram 79 espécies e na saída de maio de 2016, 67 espécies. Talvez o período em que ocorreu a saída dessa vez (inverno) tenha contribuído para essa redução.

OBSERVAÇÕES DE DESTAQUE

Um dos destaques da saída foi o tapaculo-preto (*Scytalopus speluncae*), ave com distribuição restrita à Mata Atlântica e com poucos locais de registro no Rio Grande do Sul. Como de praxe, a visualização dessa pequenina ave não foi possível, embora ela estivesse a poucos metros dos observadores, em meio à vegetação baixa e densa ao lado da estrada de SMH. Observar essa espécie é sempre muito difícil, pois raramente aparece em local mais aberto e com boa iluminação. Por outro lado, ouvi-la é muito mais fácil, uma vez que apresenta uma vocalização alta e prolongada (pode durar alguns minutos).

Logo no início da caminhada pela estrada de SMH um surucú-variado (*Trogon surrucura*) foi avistado e possibilitou que belas fotos fossem obtidas. Como sempre, essa ave é muito tranquila e se aproxima (ou permite a aproximação) dos observadores. Além do que, a beleza de suas cores é sempre uma alegria para nossos olhos.

Outro registro interessante foi o cabeçudo (*Leptopogon amaurocephalus*), que respondeu bem ao *playback* e permitiu algumas fotos. Em uma das ocasiões a ave passou voando baixo, por entre os observadores. No mesmo local foi avistado um casal de choquinha-lisa (*Dysithamnus mentalis*). Da mesma forma, um limpa-folha-de-testa-baia (*Philydor rufum*) foi atraído e pôde ser bem observado enquanto ficou pousado por alguns minutos.

Como acontece em muitas saídas do COA-POA, os mamíferos aparecem e roubam a cena por alguns instantes. Dessa vez duas espécies foram avistadas. Logo no início da caminhada um serelepe/esquilo cruzou rapidamente uma estradinha secundária àquela que estávamos. Depois, quase no final do trecho percorrido na estrada de SMH, um bugio-ruivo descansava no alto de uma árvore.

Lista dos participantes em ordem alfabética

Armando Divan
Eduardo Chiarani
Fernando de Miranda Ramos
Jorge Wolff
Mauro Moller
Marta Mincato
Robson Schuler

Relatório elaborado por Eduardo Chiarani

Lista das espécies de aves registradas na saída de 08 de julho de 2018, para Morro Reuter e Santa Maria do Herval.

Nome do Táxon	Nome em Português
Tinamidae	
<i>Crypturellus obsoletus</i>	inhambuguaçu
Cathartidae	
<i>Cathartes aura</i>	urubu-de-cabeça-vermelha
<i>Coragyps atratus</i>	urubu-de-cabeça-preta
Accipitridae	
<i>Rupornis magnirostris</i>	gavião-carijó
<i>Buteo brachyurus</i>	gavião-de-cauda-curta
Charadriidae	
<i>Vanellus chilensis</i>	quero-quero
Columbidae	
<i>Patagioenas picazuro</i>	pombão
<i>Leptotila verreauxi</i>	juriti-pupu
Cucullidae	
<i>Piaya cayana</i>	alma-de-gato
<i>Guira guira</i>	anu-branco
Apodidae	
<i>Streptoprocne sp.</i>	andorinhão-de-coleira
Trochillidae	
<i>Stephanoxis loddigesii</i>	beija-flor-de-topete
<i>Thalurania glaucopis</i>	beija-flor-de-fronte-violeta
Trogonidae	
<i>Trogon surrucura</i>	surucuá-variado
Ramphastidae	
<i>Ramphastos dicolorus</i>	tucano-de-bico-verde
Picidae	
<i>Veniliornis spilogaster</i>	picapauzinho-verde-carijó
<i>Piculus aurulentus</i>	pica-pau-dourado
Falconidae	
<i>Caracara plancus</i>	caracará

<i>Milvago chimachima</i>	carrapateiro
Psittacidae	
<i>Pyrrhura frontalis</i>	tiriba-de-testa-vermelha
<i>Pionopsitta pileata</i>	cuiú-cuiú
Thamnophilidae	
<i>Dysithamnus mentalis</i>	choquinha-lisa
<i>Thamnophilus caerulescens</i>	choca-da-mata
<i>Drymophila malura</i>	choquinha-carijó
Conopophagidae	
<i>Conopophaga lineata</i>	chupa-dente
Rhinocryptidae	
<i>Scytalopus speluncae</i>	tapaculo-preto
Formicariidae	
<i>Chamaeza campanisona</i>	tovaca-campainha
Scleruridae	
<i>Sclerurus scansor</i>	vira-folha
Dendrocolaptidae	
<i>Sittasomus griseicapillus</i>	arapaçu-verde
<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	arapaçu-rajado
Furnariidae	
<i>Furnarius rufus</i>	joão-de-barro
<i>Lochmias nematura</i>	joão-porca
<i>Philydor rufum</i>	limpa-folha-de-testa-baia
<i>Heliobletus contaminatus</i>	trepadorzinho
<i>Syndactyla rufosuperciliata</i>	trepador-quiete
<i>Synallaxis ruficapilla</i>	pichororé
Pipridae	
<i>Chiroxiphia caudata</i>	tangará
Tityridae	
<i>Schiffornis virescens</i>	flautim
Rhynchocyclidae	
<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	cabeçudo
<i>Phylloscartes ventralis</i>	borboletinha-do-mato
<i>Poecilotriccus plumbeiceps</i>	tororó

Vireonidae		
	<i>Cyclarhis gujanensis</i>	pitiguari
Corvidae		
	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	gralha-azul
Troglodytidae		
	<i>Troglodytes musculus</i>	corruíra
Turdidae		
	<i>Turdus albicollis</i>	sabiá-coleira
Passerellidae		
	<i>Zonotrichia capensis</i>	tico-tico
Parulidae		
	<i>Setophaga pitiayumi</i>	mariquita
	<i>Basileuterus culicivorus</i>	pula-pula
	<i>Myiothlypis leucoblephara</i>	pula-pula-assobiador
Icteridae		
	<i>Cacicus chrysopterus</i>	tecelão
Thraupidae		
	<i>Saltator similis</i>	trinca-ferro-verdadeiro
	<i>Tachyphonus coronatus</i>	tiê-preto
	<i>Tangara preciosa</i>	saíra-preciosa
	<i>Pipraeidea bonariensis</i>	sanhaçu-papa-laranja
	<i>Microspingus cabanisi</i>	quete
Cardinalidae		
	<i>Habia rubica</i>	tiê-do-mato-grosso
	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	azulão

Anexo Fotográfico



Surucuá-variado (*Trogon surrucura*). Foto: Jorge Wolff



Pichororé (*Synallaxis ruficapilla*). Foto: Jorge Wolff




Limpa-folha-de-testa-baia (*Philydor rufum*). Foto: Marta Mincato



Cabeçudo (*Leptopogon amaurocephalus*). Foto: Eduardo Chiarani



Choca-da-mata (*Thamnophilus caerulescens*). Foto: Eduardo Chiarani



Bugio-ruivo (*Alouatta guariba clamitans*)



Grupo de observadores na estrada de Santa Maria do Herval. Foto: Eduardo Chiarani



Grupo de observadores no mirante do Morro da Embratel, em Morro Reuter. Foto: Jorge Wolff