

Relatório da saída de campo do Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre a Morro Reuter

8 de setembro de 2019




Gilberto Muller

INTRODUÇÃO

No dia 8 de setembro de 2019, o Clube de Observadores de Aves de Porto Alegre visitou novamente o interior do município de Morro Reuter para observação de aves. Essa área está localizada a 7,5 km da cidade de Morro Reuter e a aproximadamente 72 km de Porto Alegre. Trata-se de uma região montanhosa, com vegetação nativa exuberante, onde se pode avistar muitas aves.

O tempo pela manhã estava encoberto, com chuvas esparsas e nevoeiro; a partir das 10h o tempo abriu um pouco mais e a temperatura manteve-se em torno de 25°C durante toda a manhã.

O Grupo se encontrou no pórtico de entrada para a cidade de Ivoti, às 07:30h, depois se dirigiu para o Balneário Rio Loh, de onde iniciou a caminhada pela Estrada Walachai, conforme indicado no mapa a seguir.



Os observadores percorrem uma distância aproximada de 3,5 Km pela estrada que costeia o rio e retornou pela mesma trilha. A observação iniciou às 8h e 30min e foi encerrada por volta das 11 horas. Durante o percurso, cabe destaque para as espécies Cais-cais (*Euphonia chalybea*), da qual também foi avistado o ninho pela Inês Vasconcelos; Flautim (*Schiffornis virescens*) ouvido primeiramente e depois visto por todos os integrantes do grupo; o Cabeçudo (*Leptopogon amaurocephalus*), que ficou bem próximo do grupo, permitindo uma ótima observação e boas fotos; o Bico-virado-carijó (*Xenops rutilans*), que ficou um bom tempo pousado em um galho, bem visível, e todos do grupo puderam apreciar e fotografar; Um casal de saíra-de-papo-preto (*Pipraeidea melanonota*), também encantou todos os observadores.

Cabe um agradecimento especial ao Sr. André Luiz Wittmann, observador de aves que se encontrava no local e acompanhou o grupo, ajudando na identificação de várias espécies. Também vale destacar que todos os participantes ficaram muito empenhados na identificação das espécies avistadas, durante e depois da saída.

Participaram da saída 15 observadores e foram registradas 63 espécies de aves. Também foram avistados alguns bugios alimentando-se na mata.

* Relatório elaborado por Antônio Coimbra de Brum.

ESPÉCIES REGISTRADAS

| Lista Aves registradas | |
|----------------------------------|---------------------|
| Família e Nome Científico | Nome Popular |
| Tiramidae | |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| <i>Crypturellus obsoletus</i> | Inhambuguaçu |
| CATHARTIDAE | |
| <i>Coragyps atratus</i> | urubu-de-cabeça-preta |
| <i>Cathartes aura</i> | urubu-de-cabeça-vermelha |
| ACCIPITRIDAE | |
| <i>Rupornis magnirostris</i> | gavião-carijó |
| RALLIDAE | |
| <i>Aramides saracura</i> | saracura-do-mato |
| CHARADRIIDAE | |
| <i>Vanellus chilensis</i> | quero-quero |
| COLUMBIDAE | |
| <i>Patagioenas picazuro</i> | asa-branca ou pombão |
| <i>Leptotila verreauxi</i> | juriti-pupu |
| <i>Zenaida auriculata</i> | avoante |
| PSITTACIDAE | |
| <i>Pyrrhura frontalis</i> | tiriba-de-testa-vermelha |
| CUCULIDAE | |
| <i>Piaya cayana</i> | alma-de-gato |
| TROCHILIDAE | |
| <i>Hylocharis chrysura</i> | beija-flor-dourado |
| <i>Stephanoxis loddigesii</i> | beija-flor-de-topete-azul |
| <i>Leucochloris albicollis</i> | beija-flor-de-papo-branco |
| TROGONIDAE | |
| <i>Trogon surrucura</i> | surucua-variado |
| ALCEDINIDAE | |
| <i>Megaceryle torquata</i> | martin-pescador-grande |
| PICIDAE | |
| <i>Picumnus temminckii</i> | pica-pau-anão-de-coleira |
| <i>Picumnus nebulosus</i> | pica-pau-anão-carijó |
| <i>Colaptes campestris</i> | pica-pau-do-campo |
| THAMNOPHILIDAE | |
| <i>Thamnophilus caeruleus</i> | choca-da-mata |
| <i>Dysithamnus mentalis</i> | choquinha-lisa |
| <i>Drymophila malura</i> | choquinha-carijó |
| <i>Mackenziana leachii</i> | borralhara-assobiadora |
| CONOPOPHAGIDAE | |
| <i>Conopophaga lineata</i> | chupa-dente |
| FORMICARIDAE | |
| <i>Chamaeza campanisona</i> | tovaca-campainha |
| DENDROCOLAPTIDAE | |
| <i>Dendrocolaptes platyrostris</i> | arapaçu-grande |
| <i>Sittasomus griseicapillus</i> | arapaçu-verde |
| <i>Xiphorhynchus fuscus</i> | arapaçu-rajado |
| XENOPIIDAE | |
| <i>Xenops rutilans</i> | bico-virado-carijó |
| FURNARIIDAE | |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| <i>Philydor rufum</i> | limpa-folha-de-testa-baia |
| <i>Syndactyla rufosuperciliata</i> | trepador-quiete |
| <i>Lochmias nematura</i> | joão-porca |
| <i>Synallaxis ruficapilla</i> | pichororé |
| TITYRIDAE | |
| <i>Schiffornis virescens</i> | flautim |
| RHYNCHOCYCLIDAE | |
| <i>Leptopogon amaurocephalus</i> | cabeçudo |
| <i>Poecilatriccus plumbeiceps</i> | tororó |
| TYRANNIDAE | |
| <i>Camptostoma obsoletum</i> | risadinha |
| VIREONIDAE | |
| <i>Cyclarhis gujanensis</i> | pitiguari |
| <i>Hylophilus poicilotis</i> | verdinho-coroado |
| CORVIDAE | |
| <i>Cyanocorax caeruleus</i> | gralha-azul |
| HIRUNDINIDAE | |
| <i>Progne chalybea</i> | andorinha- grande |
| TURDIDAE | |
| <i>Turdus rufiventris</i> | sabiá-laranjeira |
| <i>Turdus amaurochalinus</i> | sabiá-poca |
| <i>Turdus leucomelas</i> | sabiá-barranco |
| <i>Turdus albicollis</i> | sabiá-de-coleira |
| PASSERELLIDAE | |
| <i>Zonotrichia capensis</i> | tico-tico |
| PARULIDAE | |
| <i>Basileuterus culicivorus</i> | pula-pula |
| <i>Myiothlypis leucoblephara</i> | pula-pula-assobiador |
| <i>Setophaga pitaiyumi</i> | mariquita |
| ICTERIDAE | |
| <i>Cacicus chrysopterus</i> | tecelão |
| THRAUPIDAE | |
| <i>Saltator similis</i> | trinca-ferro |
| <i>Pipraeidea melanonota</i> | saíra-viúva |
| <i>Stephanophorus diadematus</i> | sanhaço-frade |
| <i>Sicalis flaveola</i> | canário-da-terra |
| <i>Hemithraupis guira</i> | saíra-de-papo-preto |
| <i>Trichothraupis melanops</i> | tiê-de-topete |
| <i>Tachyphonus coronatus</i> | tiê-preto |
| <i>Habia rubica</i> | tiê-de-bando |
| <i>Pyrrhocomma ruficeps</i> | cabecinha-castanha |
| <i>Poospiza nigrorufa</i> | quem-te-vestiu |
| FRINGILIDAE | |
| <i>Euphonia pectoralis</i> | ferro-velho |
| <i>Euphonia chlorotica</i> | fim-fim |
| <i>Euphonia chalybea</i> | cais-cais |

| | |
|---------------------|--|
| Total – 63 espécies | |
|---------------------|--|

Lista dos participantes

André Luiz Wittmann
Antonio Brum
Augusto Potter
Felipe Matsusaki
Gilberto S. Muller
Inês Vasconcelos
Jorge L. Wolff
Karin Mattje

Ligia Rodrigues
Marco Aurélio Antunes
Marcus Vinicius Rodrigues
Marta Mincato
Marisa Costa
Vanessa Canabarro
Viviane Zulian

ANEXO FOTOGRÁFICO



Cabeçudo

Vinicius Balmer



Vinicius Balmer

Limpa-folha-de-testa-baia



Augusto Potter

Bico-virado-carijó



Arapaçu-grande

Vinicius Balmer



Karin Mattje

Surucúa-variado



Karin Mattje

Cais-cais



Viviani Zulian

Tiê-de-topete



Vanessa Camargo



Vanessa Camargo



Vanessa Camargo